VACCIPLANT®

VACCIPLANT® è un agrofarmaco a base di laminarina. Attivo contro oidio, peronospora, ticchiolatura, botriti e batteriosi, agisce stimolando lo sviluppo delle difese naturali della pianta, attraverso lo sviluppo di sostanze che rallentano e impediscono l'avanzamento della malattia. Si applica preventivamente e garantisce protezione anche della vegetazione in formazione.

COMPOSIZIONE	Laminarina 5% (45 g/L)
FORMULAZIONE	Sospensione Liquida
INTERVALLO DI SICUREZZA	Non previsto.
N° DI REGISTRAZIONE	15831 del 12.12.2013
CONFEZIONE	L 1 - 5
INDICAZIONI DI PERICOLO	**ATTENZIONE** H317 - H319 EUH401

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/ha)	NOTE
Fragola (in pieno campo e in serra)	Mal bianco, Botrite	1	Da dopo il trapianto sino alla raccolta. Massimo 10 trattamenti all'anno. Per volumi d'acqua superiori a 500 L/ha, utilizzare la concentrazione massima di 0,2 L/hL.
Melo e Pero	Necrosi batterica	0,75 - 1	Da rottura gemme a fine caduta petali. In caso di ulteriori fenomeni infettivi, proseguire la difesa. Massimo 7 trattamenti all'anno.
	Ticchiolatura, Marciume lenticellare	0,75 - 1	Dalla ripresa vegetativa fino alla raccolta. Massimo 20 trattamenti all'anno. Per il controllo del marciume, eseguire i trattamenti nelle 3 settimane prima della raccolta.
Melo	Oidio	0,75 - 1	Dalla ripresa vegetativa fino alla raccolta. Massimo 20 trattamenti all'anno.
Vite	Oidio, Peronospora, Botrite	1 - 2	Dalla prima foglia distesa fino alla raccolta. Massimo 20 trattamenti all'anno.
Lattuga e simili incluse le baby leaf, spinaci e simili incluse le baby leaf (in pieno campo e in serra)	Bremia, Peronospora	1	Dalla terza foglia vera aperta fino alla raccolta. Massimo 6 trattamenti all'anno. Per volumi d'acqua superiori a 500 L/ha, utilizzare la concentrazione massima di 0,2 L/hL.
Actinidia	Batteriosi	1 - 2	Dalla prima foglia distesa a raccolta. Massimo 7 trattamenti.
Pomodoro, Peperone, Melanzana (in serra)	Botrite, Oidio, Batteriosi	1 - 3	Dalla prima foglia sviluppata a raccolta. Massimo 7 trattamenti.
Fagiolino (in serra)	Botrite	1 - 3	Dalla prima foglia sviluppata a raccolta. Massimo 7 trattamenti.
Cucurbitacee (in serra)	Botrite, Peronospora, Oidio	1 - 3	Dalla prima foglia sviluppata a raccolta. Massimo 7 trattamenti.
Brassicacee e Bietole da foglia (in serra)	Peronospora	1	Dalla prima foglia sviluppata a raccolta. Massimo 7 trattamenti. Per volumi d'acqua superiori a 500 L/ha, utilizzare la concentrazione massima di 0,2 L/hL.

@ - Maggiori dettagli a pag.7

- **Laminarina è un induttore delle autodifese della pianta**
- **Elevata miscibilità e compatibilità con altri agrofarmaci**
- **Utilizzabile in agricoltura biologica**