YUKON ULTRA®

FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

MECCANISMO D'AZIONE: CODICE FRAC M01 (rame), M02 (zolfo)

YUKON ULTRA®

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Rame metallo (da rame solfato tribasico)	g	5,4 (80 g/L)
Zolfo puro (esente da Selenio)	g	43,2 (640 g/L)
Coformulanti q.b. a	g	100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P264 - Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P391 - Raccogliere la fuoriuscita. P501 - Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione:
UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. - Claudius Prinsenlaan 144 A, 4818 CP, Breda, NOORD-BRABANT, The Netherlands Tel. +31 (0) 850712300

Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – Via Terni 275, 47522 S. Carlo di Cesena (FC), Tel. 0547 661523

Stabilimento di produzione: UPL Europe Ltd., CW11 3QQ Sandbach, Cheshire (UK); Cerexagri, 33530 Bassens, (Francia); Cerexagri, 13014 Marseille, Le Canet (Francia); Cerexagri, 64150 Mourenx (Francia); UPL Ltd., 117, G.I.D.C., Ankleshwar (India); UPL Ltd., 3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar (India); UPL Ltd., 3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar (India); UPL Ltd., 3-11, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat (India); UPL Ltd., 750, GIDC, Jhagadia 396-195, Gujarat (India); Phyteurop SA - Montreuil-Bellay (Francia); Arysta LifeScience Ougrée Production sprl, B-4102 Ougrée (Belgio); Arysta LifeScience SAS, Route d'Artix, 64150 Nogueres (Francia); Laoting Yoloo Bio-Technology Co.Ltd, Laoting Economic Development Zone, Hebei (Cina);

Officine di confezionamento: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA); GI.MA SRL – Via Nino Bixio 6, 44042 Cento (FE).

Officine di ri-etichettatura: ARCO Logistica Srl – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara; ARCO Logistica Srl – Via G. Monari 5, 44123 Ferrara; CDM Srl – Via Caduti di Nassiriya 1A, Z.A. Le Prese, 31010 Cimadolmo (TV)

Registrazione del Ministero della Salute n. 18691 del 22/10/25

Contenuto netto: 250 mL, 1, 5, 10, 20, 220*, 600*, 1000* L **Partita n° ……..**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. In generale, non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le attività di rientro indossare sempre guanti da lavoro.

Per proteggere gli organismi acquatici:
- su vite, bietole e pomodoro rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 20 metri da corpi idrici superficiali;
- su frumento, segale, triticale e farro rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 10 metri da corpi idrici superficiali;
- su olivo rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 25 m, di cui 20 m di fascia di sicurezza vegetata, da corpi idrici superficiali;
- su frutta a guscio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m, di cui 20 m di fascia di sicurezza vegetata, da corpi idrici superficiali;

Per proteggere gli artropodi non bersaglio:
- su vite, bietole e pomodoro rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 3 metri da aree non coltivate utilizzando ugelli che riducano la deriva del 90% oppure di 5 metri con ugelli che riducano la deriva del 75%;
- su frumento, segale, triticale e farro rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 1 metro da aree non coltivate utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50%;
- su olivo e frutta a guscio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri da aree non coltivate utilizzando ugelli che riducano la deriva del 90% oppure di 20 m con ugelli che riducano la deriva del 75%;

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non applicare complessivamente più di 10 L di prodotto per ettaro, quando le colture sono in fioritura o quando siano presenti piante infestanti in fiore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia**: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: YUKON ULTRA® è un fungicida in formulazione liquida a base di rame e zolfo per il controllo di numerose malattie fungine e batteriche delle colture agrarie.
Il contenuto in rame metallo attivo e la speciale formulazione conferiscono a YUKON ULTRA® un'azione fungicida e batteriostatica anche con ridotti apporti di rame per ettaro.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Con riferimento alle dosi indicate in tabella, utilizzare in linea di principio quelle più elevate in caso di alta pressione della malattia e nelle fasi di maggiore suscettibilità della coltura.

Coltura	Avversità	Dose (L/ha)	Dose (L/hL)	Indicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
VITE DA VINO E DA TAVOLA	Peronospora (*Plasmopara viticola*); Oidio (*Erysiphe necator*); Marciume nero o Black-Rot *(Guignardia bidwellii - sin. Phyllosticta ampelicida)*	4 - 10	0,4 - 1	Intervallo minimo: 5 giorni Numero massimo di applicazioni: 18	7
OLIVO	Occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea, Venturia oleaginea*); Lebbra o Antracnosi (*Gloeosporium olivarum, Colletotrichum* spp.); Batteriosi o Rogna (*Pseudomonas savastanoi*); Piombatura o Cercosporiosi (*Pseudocercospora cladosporioides*)	4 - 10	0,3 - 1	Intervallo minimo: 7 giorni Numero massimo di applicazioni: 15	14
FRUTTA A GUSCIO Nocciolo, mandorlo, noce, castagno, pistacchio	Antracnosi (*Colletotrichum* spp., *Gnomonia juglandis*); Batteriosi (*Pseudomonas* spp., *Xanthomonas* spp.); Mal dello stacco *(Cytospora corylicola);* Macchia rossa (*Polystigma* spp.*);* Bolla *(Taphrina deformans)*	4 - 10	0,4 - 1,5	Intervallo minimo: 7 giorni Numero massimo di applicazioni: 3	14
POMODORO (pieno campo)	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternariosi (*Alternaria* spp.), Oidio (*Oidium neolycopersici*, *Leveillula taurica, Erysiphe* spp.*)* Batteriosi (*Pseudomonas* spp.; *Xanthomonas* spp)	4 - 10	0,4 - 1	Intervallo minimo: 5 giorni Numero massimo di applicazioni: 18	3
BIETOLE (pieno campo) Barbabietole da zucchero e da	Oidio (*Erysiphe betae*), Cercospora (*Cercospora beticola*)	5,5 - 10	-	Intervallo minimo: 5 giorni Numero massimo di applicazioni: 6	14

® Marchio registrato gruppo UPL

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22/10/25

Coltura	Avversità	Dose (L/ha)	Dose (L/hL)	Indicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
foraggio, bietola rossa e dorata, rapa, sedano rapa, rafano					
FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, FARRO	Septoriosi (Septoria spp.)	5 - 8	-	Applicare Yukon Ultra prima della fioritura (BBCH 30-61). Numero massimo di applicazioni: 2 Intervallo minimo: 7 giorni.	35

Le dosi sopra riportate si riferiscono all'utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha; olivo: 1500 L/ha, orticole: 1000 L/ha). In caso di volumi diversi, rispettare le dosi ad ettaro.
Per l'impiego con irroratrici a recupero di volume o nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN) sopraindicati (es. vite fino alla fase di fioritura), si suggerisce di fare riferimento alla sola dose in litri per ettolitro (L/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agro climatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

UTILIZZO DEL PRODOTTO: agitare la confezione prima dell'uso, versare YUKON ULTRA® direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l'agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente attivare l'agitatore.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc…), olii minerali, captano e prodotti contenenti solventi organici. In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: YUKON ULTRA® è un prodotto fitosanitario ad azione multisito (rame M01, zolfo M02). Attenersi alle indicazioni riportate in etichetta. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

FITOTOSSICITÀ: si consiglia di non trattare durante la fioritura. Non trattare con pianta bagnata (es. rugiada) o con temperature molto elevate. Per evitare problemi di scottature solari (sun burn) prestare attenzione alle giornate limpide e particolarmente soleggiate. Limitare i volumi di bagnatura per evitare gocciolamenti e depositi. Visto il rapido evolversi di nuove varietà si consiglia di effettuare sempre una prova di saggio su una porzione limitata di campo prima dell'impiego.

INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all'intervallo di sicurezza riportato in tabella.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

***Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

® Marchio registrato gruppo UPL

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22/10/25