LONDAX® 60 DF

Erbicida solfonilureico specifico contro infestanti non graminacee delle risaie - Granuli Idrodispersibili

Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

UFI: WSDR-H04X-4VKF-0KHT

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Bensulfuron metile puro	g 60
Coformulanti q.b. a	g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208 Contiene Bensulfuron metile può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P280 Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare della registrazione:
UPL Iberia SA - Av Josep Tarradellas, num. 20 Planta 4, Puerta 7 - 08029 Barcelona - (Spagna) – tel. +34 932 402910

Distribuito da:
UPL ITALIA S.r.l. – Via Terni, 275 S. Carlo di Cesena (FC)

Officine di Produzione e/o Confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia; **Du Pont Australia Ltd –** Girraween, NSW 2145 (Australia); **UPL Europe Ltd. –** Sandbach, Cheshire CW11 3QQ (UK) - **UPL Ltd. -** SAMBA (Jammu & Kashmir) 184 121 India **- Arysta Lifescience Ougrée Production SPRL** – Ougrée (Belgio); **Laboratoire Didier Varenne SARL** - Rue du Chateau, 2-6 - 60126 Rivecourt (Francia). **Exwold Technology** - Queens Meadow, Hartlepool, TS25 2DL (UK)
Stabilimento di ri-etichettatura: ARCO Logistica S.r.l. – Via A. Battistella, 22 - 44123 Ferrara.

Registrazione N. 7441 del 9/03/1988 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100–200–500–kg 1

Partita N°.....del …….

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Indossare una protezione oculare/facciale durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia non trattata di 5 metri da vegetazione naturale.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE

LONDAX® 60 DF è un erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie.
Infestanti sensibili: *Alisma plantago-aquatica* (cucchiaio), *Ammannia* spp. (ammannia), *Bolboschenus* (=*Scirpus*) *maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus* (=*Scirpus*) *mucronatus* (quadrettone), *Typha spp.* (lisca).
Infestanti moderatamente sensibili: *Butomus umbellatus (giunco fiorito), Cyperus* spp. (zigolo), *Heteranthera reniformis* e *Heteranthera rotundifolia* (eterantere), *Polygonum lapathifolium* (=*Persicaria lapathifolia*) (poligono nodoso).
In generale, l'effetto erbicida di LONDAX® 60 DF è migliore su piante piccole e in attiva crescita.

MODALITÀ DI IMPIEGO

LONDAX® 60 DF si impiega alla dose di 100 g per ettaro in risaia umida (0-1 cm di acqua) oppure uniformemente sommersa con 5-10 cm d'acqua. Il trattamento può essere eseguito da 20 a 30 giorni dopo la semina del riso, in combinazione o meno con prodotti specifici contro il giavone. Su *H. reniformis* ed *H. rotundifolia*, LONDAX® 60 DF deve essere distribuito quando tali infestanti sono nello stadio di sviluppo di "foglioline basali".
Utilizzare volumi di acqua compresi tra 200 e 400 litri per ettaro. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente con le normali attrezzature usate per il diserbo del riso. Dopo il trattamento su risaia umida attendere 24-48 ore prima di reimmettere acqua. **Dopo il trattamento (sia su risaia umida che sommersa) l'acqua, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma nelle camere (5-10 cm) per almeno 15 giorni.**
Piogge abbondanti, tali da determinare la fuoriuscita dell'acqua dalle camere nei primi giorni successivi al trattamento possono ridurre l'attività erbicida. LONDAX® 60 DF non è volatile e quindi non costituisce pericolo per le colture adiacenti diverse dal riso, le quali però non devono essere investite direttamente dall'irrorazione.
Avvertenze: non applicare LONDAX® 60 DF su colture sotto stress per anormali condizioni climatiche, malattie, insetti o eventualmente già danneggiate da altri erbicidi.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE: dopo l'applicazione e comunque prima di eseguire trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia del prodotto dall'attrezzatura d'irrorazione.

CONSERVAZIONE: Il prodotto nel suo imballo originale sigillato ha una stabilità garantita di almeno 2 anni.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di irrorare direttamente o tramite deriva colture o piante arboree. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili.
Avvertenze: subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca) nella misura di 0,5 L/hl di acqua. Risciacquare interamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% ca.

GESTIONE DELLE RESISTENZE:

Allo scopo di prevenire o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti è necessario alternare l'applicazione di LONDAX® 60 DF a quella di erbicidi aventi un differente meccanismo d'azione e adottare pratiche agronomiche adatte al controllo delle malerbe, quali la rotazione colturale, la falsa semina, mezzi meccanici ecc..

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con i mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

® Marchio registrato della UPL

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16/10/2017 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 26/08/2025