LONDAX® 60 DF

LONDAX® 60 DF è un erbicida solfonilureico per il controllo delle principali infestanti non graminacee della risaia. È caratterizzato da bassa dose d'impiego e buona selettività per il riso. Assorbito dalle foglie e in parte dalle radici, viene traslocato ai tessuti meristematici delle piante trattate provocandone l'arresto della crescita.

COMPOSIZIONE	Bensulfuron-metile puro 60%
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili
INTERVALLO DI SICUREZZA	Non previsto.
N° DI REGISTRAZIONE	7441 del 09.03.1988
CONFEZIONE	Kg 0,5
INDICAZIONI DI PERICOLO	**ATTENZIONE** H319 - H410 EUH208 - EUH401

COLTURE	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)
Riso	In risaia umida (0 - 1 cm d'acqua) oppure uniformemente sommersa con 5 - 10 cm d'acqua. Il trattamento può essere eseguito da 20 a 30 giorni dopo la semina del riso, in combinazione o meno con prodotti specifici contro il giavone. Dopo il trattamento su risaia umida attendere 24 - 48 ore prima di reimmettere acqua. Dopo il trattamento (sia su risaia umida che sommersa) l'acqua, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma nelle camere (5 - 10 cm) per almeno 15 giorni.	100

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili: *Alisma plantago-aquatica* (cucchiaio), *Ammannia spp.* (ammannia), *Bolboschenus (=Scirpus) maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus (=Scirpus) mucronatus* (quadrettone), *Typha spp.* (lisca).
Infestanti moderatamente sensibili: *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Cyperus spp.* (zigolo), *Heteranthera reniformis e Heteranthera rotundifolia* (eterantere), *Polygonum lapathifolium (=Persicaria lapathifolia)* (poligono nodoso).

- **Attivo su un'ampia gamma di infestanti, tra le quali Butomus umbellatus, Tipha spp. e Bolboschenus maritimus**
- **Elevata selettività nei confronti della coltura**