ROYAL MH

FITOREGOLATORE FORMULATO COME CONCENTRATO SOLUBILE PER IL CONTROLLO DEI GERMOGLI ASCELLARI PRIMARI E SECONDARI DEL TABACCO

Composizione
Idrazide maleica pura g. 16,4 (=186,5 g/l)
(contenente meno di 0,028 mg/kg di idrazina)
Coformulanti q.b.a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PRODOTTO FITOSANITARIO Reg. Ministero della Sanità N. 7534 del 22/09/1988

Titolare della registrazione: UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.

Claudius Prinsenlaan 144 A, 4818 CP, Breda, NOORD-BRABANT, The Netherlands Tel. +31 (0) 850712300

Officine di produzione: Lanxess Solutions Italy Srl - Latina Scalo (LT); Althaller Italia Srl – S. Colombano al Lambro (MI); GI.MA S.r.l. – Cento (FE); Arysta Lifescience Ougrée Production sprl – Ougrée (Belgio); Arysta LifeScience S.A.S. – Noguères (Francia); Arysta LifeScience India Limited – Kalol (India); UPL Europe Ltd. - Cheshire (UK); Cerexagri S.A. – Bassens (Francia); Cerexagri S.A. - Marsiglia, Le Canet (Francia); Cerexagri S.A. - Mourenx (Francia); Superform Chemistries Ltd. - Ankleshwar (India); UPL Ltd. - Ankleshwar (India); Superform Chemistries Ltd. - Vapi (India); Superform Chemistries Ltd. - Jhagadia (India); Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd - Hebei (Cina).
Stabilimento di rietichettatura: ARCO Logistica Srl – Ferrara (FE); CDM Srl - Cimadolmo (TV).

Distribuito da: UPL ITALIA SRL - Via Terni 275, S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523

Partita n.

Contenuto: Litri 1[1] - 5[1] - 20[1] - 25[1] - 500[2,3] - 1000[2,3]

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta. Indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

Il **Royal MH** è un fitoregolatore che viene assorbito dalla pianta per via fogliare e traslocato in ogni suo organo per via linfatica. Nei germogli, inibisce principalmente i processi respiratori delle cellule, riduce le attività enzimatiche, rallenta la moltiplicazione cellulare. La sommatoria di queste complesse azioni impedisce lo sviluppo dei germogli e dei succhioni principali e secondari.

Dosi d'impiego

Diluire 1,83-3,38 litri di **Royal MH** in 100 litri di acqua, impiegando 400-600 litri di soluzione per ettaro (corrispondente a 11-13,5 litri di prodotto per ettaro).
Solo in caso di piante vigorose la dose consigliata ad ettolitro può essere aumentata a 2,62-3,94 litri/ettolitro impiegando 400-600 litri di soluzione per ettaro (corrispondente a 15,75 litri di prodotto per ettaro).

Modalità di applicazione

Impiegare barre con pompe ad alta pressione (3-5 atm.), usando ugelli a getto sottile tipo conico e bagnando bene non solo la metà superiore ma tutta la pianta. Se si considera la fila delle piante di tabacco utilizzare possibilmente i due ugelli laterali escludendo quello centrale per evitare di concentrare il prodotto sulle giovani foglie apicali che hanno bisogno di svilupparsi.

Epoca di impiego

Eseguire il trattamento con **Royal MH** dopo la cimatura, una volta che le foglie apicali hanno raggiunto una lunghezza di 15-20 cm o sono completamente sviluppate.
Avvertenze:
- Applicare il prodotto uniformemente su foglie asciutte;
- Per ottenere un buon risultato, bagnare perfettamente non solo la metà superiore ma tutta la pianta;
- Applicare il **Royal MH** solo su piante sane e turgide in modo da garantire un perfetto assorbimento.
- Momenti ideali per il trattamento sono: la mattina presto o in giornate nuvolose e comunque 1 o 2 giorni dopo l'irrigazione;
- Poiché l'efficacia del prodotto dipende dalla quantità di principio attivo assorbito, si sconsiglia l'impiego con temperature ambientali troppo elevate, su piante appassite e in presenza di vento;
- Non usare il prodotto su tabacco da seme ed evitare di bagnare colture vicine;
- Un anticipato ingiallimento delle foglie in seguito al trattamento non è indice di maturità fisiologica e non può essere preso a riferimento per stabilire l'epoca di raccolta.

Compatibilità

Usare il prodotto da solo.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta
Avvertenza: proteggere dal gelo, non conservare a temperature inferiori ai 5°C.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

[1]Il contenitore non può essere riutilizzato
[2] ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente.
[3] Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23.06.2026