DELTAGRI®

DELTAGRI® è un insetticida ad ampio spettro che agisce per contatto e ingestione. Dotato di una rapida azione abbattente, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

COMPOSIZIONE	Deltametrina pura g 2,8 (25 g/L)
FORMULAZIONE	Concentrato emulsionabile
INTERVALLO DI SICUREZZA	30 gg per agrumi, frutta a guscio, mais, frumento, orzo, segale, avena, barbabietola da zucchero; 14 gg per erba medica; 7 gg per pomacee, drupacee, vite, olivo, patata, cavoli (eccetto cavolo cinese, cavolo riccio e cavolo rapa), cavolfiore, broccoli, pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava, aglio, cipolla, porro, tabacco, bietola rossa, lattuga; 3 gg per fragola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, carciofo, prezzemolo, foglie di sedano, rucola.
N° DI REGISTRAZIONE	15537 del 20.01.2014
CONFEZIONE	L 1
INDICAZIONI DI PERICOLO	**PERICOLO** H226 - H302 - H304 - H315 H318 - H336 - H410 - EUH401

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/hL)	NOTE
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo, Arancio Amaro)	Afidi (*Myzus persicae*)	30-50	
	Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*), Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*)	50	
Frutta a guscio (Mandorlo, Noce, Castagno, Pistacchio, Nocciolo)	Afidi (*Hyalopterus spp.*), Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica *(Halyomorfa halys)*	30	
	Cydia (*Laspeyresia*) pomonella, Cydia (*Laspeyresia*) splendana, Tignola orientale *(Cydia molesta)*	50	
	Vespa dei semi del pistacchio (*Eurytoma plotnicovi*)	50	
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo)	Cydia (*Laspeyresia*) pomonella, Psilla del melo (*Psylla mali*), Afidi (*Aphis pomi, Dysaphis plantaginea*) Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica *(Halyomorfa halys),* Tignola orientale *(Cydia molesta)*	30 - 50	
	Ricamatori (*Adoxophyes orana, Archips rosanus*)	35	
	Psilla del pero (*Psylla pyri*)	50	
Drupacee (Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino, Ciliegio)	Ricamatori (*Adoxophyes orana, Archips rosanus*), Anarsia lineatella	35	
	Mosca delle ciliegie (*Rhagoletis cerasi*), Cimice asiatica *(Halyomorfa halys),* Moscerino dei piccoli frutti *(Drosophila suzukii)*	40 - 50	
	Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*)	50	
	Afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus pruni*), Cydia (*Laspeyresia*) funebrana, Coleottero giapponese (*Popillia japonica Newmann*), Tignola orientale *(Cydia molesta)*	30 - 50	
Vite (da tavola e da vino)	Tignoletta (*Lobesia botrana*)	50 50 - 70	1° generazione. 2° e 3° generazione.
	Tignola (*Clysia ambiguella*), *Scaphoideus titanus*, Cimice asiatica *(Halyomorfa halys)*	50 - 70	
	Empoasca spp.	50	
	Coleottero giapponese (*Popillia japonica Newmann*) Moscerino dei piccoli frutti *(Drosophila suzukii)*	30 - 50	
Fragola (in campo e in serra)	Afidi (*Aphis spp.*), Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica *(Halyomorfa halys),* Moscerino dei piccoli frutti *(Drosophila suzukii)*	50	

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/hL)	NOTE
Olivo	Mosca (*Bactrocera oleae*)	50	
	Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*)	50	
	Euphyllura spp., Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica *(Halyomorfa halys)*, Sputacchina *(Philaenus spumarius)*	30 - 50	
	Tignola (*Prays oleae*)	30 50	Gen. antofaga. Gen. carpofaga.
Pomodoro, Peperone, Melanzana (in campo)	Nottue fogliari (*Helicoverpa armigera, Spodoptera spp.*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae*)	50	
	Cimice (*Nezara viridula*)	30	
	Nottue terricole (*Agrotis spp.*), Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica *(Halyomorfa halys),*	300 - 500 mL/ha	
Cipolla, Porro, Aglio	Tripidi (*Thrips tabaci*), Nottue (*Agrotis spp.*)	300 - 500 mL/ha	
Peperone (in serra)	Nottue fogliari (*Helicoverpa armigera, Spodoptera spp.*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae*)	50	
	Cimice (*Nezara viridula*)	30	
	Mosca bianca (*Trialeurodes vaporariorum*)	70	
Pomodoro, Melanzana (in serra)	Nottue fogliari (*Helicoverpa armigera, Spodoptera spp.*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae*)	50	
	Cimice (*Nezara viridula*)	30	
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero (in campo e serra)	Nottue fogliari (*Helicoverpa armigera, Spodoptera spp.*), Afidi (*Aphis spp., Hyperomyzus lactucae*), Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica *(Halyomorfa halys),*	300 - 500 mL/ha	
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero (in campo)	Nottue terricole (*Agrotis spp.*), Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica *(Halyomorfa halys),*	300 - 500 mL/ha	
Cavolfiore, Broccoli	Cavolaia (*Pieris spp.*), Nottue fogliari (*Mamestra brassicae, Plusia gamma, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis*), Afidi (*Myzus persicae, Brevicoryne brassicae*), Nottue terricole (*Agrotis spp.*)	300 - 500 mL/ha	
	Plutella xylostella	500 mL/ha	
Lattuga (in campo)	Nottue fogliari (*Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites*), Afidi (*Nasonovia ribisnigri, Hyperomyzus lactucae, Aphis spp.*)	50	
	Nottue terricole (*Agrotis spp.*), Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica *(Halyomorfa halys),*	300 - 500 mL/ha	
Prezzemolo, Foglie di Sedano, Rucola	Afidi (*Aphis spp.*), Nottue fogliari (*Spodoptera exigua, Mamestra spp., Chrysodeixis chalcites*)	50	
	Nottue terricole (*Agrotis spp.*)	300 - 500 mL/ha	
Fagiolo, Fava, Cece, Lenticchia	Nottue fogliari (*Helicoverpa armigera*), Afidi (*Myzus persicae, Aphis spp.*), Nottue terricole (*Agrotis spp.*), Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica *(Halyomorfa halys),*	300 - 500 mL/ha	
Pisello	Afide (*Acyrthosiphon pisum*), *Sitona spp.*	250 mL/ha	
	Afide nero (*Aphis fabae*), Tignola (*Laspeyresia nigricana*), Tripide (*Thrips angusticeps*), Nottue terricole (*Agrotis spp.*), Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica *(Halyomorfa halys)*	300 - 500 mL/ha	

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/hL)	NOTE
Patata	Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*)	500 mL/ha	
	Nottue fogliari (*Spodoptera littoralis*), Tignola della patata (*Phthorimaea Operculella*)	300 - 500 mL/ha	
Cotone (per uso tessile)	Tignola (*Pectinophora gossypiella*), Nottua (*Helicoverpa armigera*)	500 - 700 mL/ha	
	Bemisia tabaci, Empoasca spp.	500 mL/ha	
	Spodoptera spp., afidi (*Aphis gossypii*), Nottue terricole (*Agrotis spp.*)	300 - 500 mL/ha	
Tabacco	Tripidi (*Thrips tabaci*), Nottue terricole (*Agrotis spp.*)	300 - 500 mL/ha	
Barbabietola da Zucchero, Bietola Rossa	Afidi (*Aphis fabae, Myzus persicae*), Mosca (*Pegomya spp.*), Altica (*Chaetocnema tibialis*), Nottue (*Agrotis spp., Spodoptera spp.*), Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica *(Halyomorfa halys)*	300 - 500 mL/ha	
	Cassida (*Cassida nebulosa*)	500 mL/ha	
Mais	Piralide (*Ostrinia nubilalis*), Sesamia (*Sesamia nonagroides*), Nottue (*Agrotis spp., Spodoptera spp., Helicoverpa armigera*), Afidi (*Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae*), Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica *(Halyomorfa halys)*	300 - 500 mL/ha	
	Diabrotica virgifera	500 mL/ha	
Frumento, Orzo, Segale, Avena	Afidi (*Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae*), *Agrotis spp.*	300 - 500 mL/ha	
Erba medica	Afidi (*Acyrthosiphon pisum, Apion pisi*), Hypera postica	250 mL/ha	
Ornamentali (in campo e in serra)	Afidi (*Myzus spp.*), Tripidi (*Thrips tabaci*)	50	
	Mosca bianca (*Trialeurodes vaporariorum*),	70	
	Lepidotteri (*Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.*)	35	

- **Agisce per contatto e ingestione ed è indicato per il controllo di afidi, lepidotteri, aleurodidi, coleotteri e tripidi delle principali colture orticole, frutticole ed estensive/industriali**
- **Ampia etichetta**
- **Elevata attività abbattente**