

# TARLYS

**Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), per il controllo della ticchiolatura, e per vite, per il controllo della muffa grigia**  
**Emulsione concentrata**

## TARLYS

Autorizzazione del Ministero della salute n. 17296 del 27/09/2018

### Composizione

100 g di TARLYS contengono:  
Cyprodinil puro 30 g  
Coformulanti q.b. a 100 g

### INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 -

Provoca grave irritazione oculare. H410

- Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 - Contiene Cyprodinil e 2-ethylhexyl estere. Può provocare una reazione allergica.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 -** tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.



## ATTENZIONE

**NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno 17/A - 20122 Milano;**  
sede amm.va via Guelfa 5 - 40138 - Bologna.

Tel. 051 0394022

### Stabilimento di produzione:

ADAMA Maktreshim Ltd. - Beer-Sheva (Israele)  
NUFARM SAS, Notre Dame de la Gareme, 27600 Gallion, Francia

### Stabilimento di confezionamento:

Alhaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)  
KOLLANT S.r.l. - Vigonovo (VE)

### Distribuito da:

Diachem S.p.A. - Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG). Tel. 0363 355611

**Contenuto:** 250 - 500 ml; 1 - 5 l

Partita n. Vedi timbro

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare:

- In una fascia di rispetto non trattata di 20 m (di cui vegetata non trattata di 10 m) dai corpi idrici superficiali in caso di applicazioni su melo e pero.
- In una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m dai corpi idrici superficiali in caso di applicazioni su vite da vino e da tavola.

Usare guanti adatti ed occhiali di protezione durante la miscelazione ed il carico del prodotto. Usare un cappello a tesa larga, guanti adatti e tuta completa durante l'applicazione del prodotto su melo e pero. Usare un cappuccio con visiera, guanti adatti e tuta completa durante l'applicazione del prodotto su vite. Usare guanti adatti per eventuali lavorazioni da svolgere sulle colture trattate.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Sintomi specifici e rilevati solo su animali da laboratorio con sudosaggi:

**Terapia sintomatica.**

### Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

**TARLYS** è un fungicida sistemico a base di cyprodinil, sostanza attiva sistemica facente parte della famiglia delle anilino-pirimidine.

Agisce interferendo con la biosintesi degli aminoacidi, inibendo la crescita del micelio e la sua penetrazione sulla superficie fogliare.

**TARLYS** non presenta resistenza incrociata con benzimidazoli, carbamati, dicarbosimidi, imidazoli, strobilurine, triazoli, morfoline e quinoline.

Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare più di 4 anilino-pirimidine sulla stessa coltura per stagione. Si consiglia comunque l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

**TARLYS** è selettivo nei confronti della più comune entomofauna utile.

### EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

#### - MELO

contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis*): 50 - 100 ml in 100 l d'acqua (massimo 0,75 l/ha) in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 7 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce.

#### - PERO

contro ticchiolatura (*Venturia pyrina*), maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*): 50 - 100 ml in 10 l di acqua (0,75 l/ha) in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 7 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce.

#### - VITE DA VINO

contro botrite (*Botrytis cinerea*): 75 - 250 ml in 100 l d'acqua (0,75 - 1,25 l/ha). Intervenire nelle fasi più sensibili allo sviluppo della malattia, da pre-chiusura ad invaiatura.

#### - VITE DA TAVOLA

contro botrite (*Botrytis cinerea*): 75 - 250 ml in 100 l d'acqua (0,75 - 1,25 l/ha). Intervenire nelle fasi più sensibili allo sviluppo della malattia, da pre-chiusura ad invaiatura.

Coltura	Parassita	Dose max p.f. (ml/ha)	Dose max p.f. (l/ha)	N. max trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
MELO	Ticchiolatura ( <i>Venturia pyrina</i> ) <i>Venturia inaequalis</i>	50 - 100	0,75	3	750 - 1500
PERO	Ticchiolatura ( <i>Venturia pyrina</i> ) Maculatura bruna ( <i>Stemphylium vesicarium</i> )	50 - 100	0,75	3	750 - 1500
VITE DA VINO	Botrite ( <i>Botrytis cinerea</i> )	75 - 250	0,75 - 1,25	2	500 - 1000
VITE DA TAVOLA	Botrite ( <i>Botrytis cinerea</i> )	75 - 250	0,75 - 1,25	2	500 - 1000

**COMPATIBILITÀ:** TARLYS è miscibile con altri antiparassitari.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta

**Sospendere i trattamenti 60 giorni per pero e melo; 21 giorni per vite da vino e per vite da tavola.**

**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI!**  
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**  
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**