CENTURION® 240 NEO

CENTURION® 240 NEO è un erbicida sistemico di post-emergenza, selettivo, non residuale per il controllo delle graminacee annuali e perenni in un'ampia gamma di colture a foglia larga e per il controllo del riso crodo con falsa semina su riso. **CENTURION® 240 NEO** deve essere applicato in miscela con un coadiuvante oleoso (esempio: Ecomix).

COMPOSIZIONE	Clethodim puro g 25,2 (240 g/L)
FORMULAZIONE	Concentrato emulsionabile
INTERVALLO DI SICUREZZA	100 gg per girasole; 60 gg per soia, barbabietola da zucchero e da foraggio; 56 gg per patata, cipolla; 40 gg per erba medica, carota, carciofo; 30 gg per pomodoro; 21 gg per vite.
N° DI REGISTRAZIONE	16461 del 03.11.2015
CONFEZIONE	L 1- 5
INDICAZIONI DI PERICOLO	**PERICOLO** H304 - H317 - H336 H411 - EUH401 - EUH066

COLTURE	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSE (L/ha)	NOTE
Barbabietola da zucchero e da foraggio	Post-emergenza delle infestanti	1,0 - 1,5	Una sola applicazione/stagione dalla fase di 2 foglie vere della coltura e prima che l'accrescimento della coltura impedisca un'adeguata penetrazione della miscela sulle infestanti.
Erba medica		0,5 - 1,0	Una sola applicazione/stagione dalla fase di 2 foglie fino a 9 o più foglie vere e prima che l'accrescimento della coltura impedisca una adeguata penetrazione della miscela sulle infestanti.
Carciofo		0,5 - 1,5	Una sola applicazione/stagione dopo il trapianto, dalla fase di 2 foglie vere della coltura fino a inizio della levata.
Carota		0,5 - 1,0	Una sola applicazione/stagione dalla fase di 2 foglie vere della coltura fino al raggiungimento del 50% del diametro di accrescimento della radice.
Cipolla		0,75 - 1,0	Una sola applicazione/stagione dalla 2° foglia della coltura fino al 50% dell'accrescimento del bulbo.
Vite		1,0 - 1,5	Una sola applicazione/stagione dal periodo dormienza alla pre-raccolta.
Soia		0,75 - 1,25	Una sola applicazione/stagione dalla fase di 2 foglie fino a 9 o più foglie vere e prima che l'accrescimento della coltura impedisca un'adeguata penetrazione della miscela sulle infestanti.
Patata		0,75 - 1,5	Una sola applicazione/stagione dalla fase di 2 foglie vere della coltura fino a quando la vegetazione copre il 30% del terreno e prima che l'accrescimento della coltura impedisca un'adeguata penetrazione della miscela sulle infestanti.
Girasole		0,75 - 1,5	Una sola applicazione/stagione dalla fase di 2 foglie fino a 9 o più foglie vere.
Pomodoro		0,75 - 1,5	Una sola applicazione/stagione dalla fase di 2 foglie fino a 9 o più foglie vere.
Riso	Pre-semina della coltura, post-emergenza delle infestanti	0,75	Una sola applicazione/stagione in pre-semina. Si consiglia di fare una falsa-semina prima dell'applicazione al fine di indurre le infestanti ad emergere, soprattutto per quanto riguarda il riso selvatico. Se il campo viene anche allagato, deve essere svuotato prima di trattare. L'applicazione deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della semina riso.

INFESTANTI CONTROLLATE:

Avena spp. (Avena selvatica), *Bromus spp.* (Forasacco), *Ricacci di cereali, Digitaria spp.*(Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavone), *Leptochloa spp.*, *Lolium spp.* (Loglio), *Oryza spp.* (Riso), *Panicum spp.* (Falso panico), *Phalaris spp.* (Falaride), *Poa spp.* (Fienarola), *Setaria spp.* (Setaria), *Agropyron spp.* (Gramigna) *Paspalum distichum,* (Panico acquatico), *Cynodon dactylon* (Gramigna comune), *Sorghum halepense* (Sorghetta).

- **Ampio spettro d'azione: elevata efficacia su graminacee annuali e perenni**
- **Applicato in post-emergenza, garantisce una perfetta selettività sulle colture dicotiledoni**
- **Rapido assorbimento fogliare e traslocazione al sito d'azione**