BISCONE

BISCONE è un fungicida indicato per la lotta contro le moniliosi, le botriti, l'oidio e la cladosporiosi su diverse colture. Il formulato si caratterizza per un rapido assorbimento nei tessuti della pianta, un'attività prolungata e forte resistenza al dilavamento.

COMPOSIZIONE	Boscalid 26,7% - Pyraclostrobin 6,7%
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili
INTERVALLO DI SICUREZZA	3 gg pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio, fragola, pomodoro, melanzana, peperone, frutti di piante arbustive ed altre bacche; 14 gg prima della raccolta su lattughe ed insalate (eccetto scarola), spinaci, bietole da foglia e da costa, broccoli, cavolfiore, carota, cipolla, aglio, scalogno ed erbe aromatiche; 21 gg per scarola; 28 gg per nocciolo; 120 gg per asparago.
N° DI REGISTRAZIONE	18439 del 15.03.2024
CONFEZIONE	kg 1
INDICAZIONI DI PERICOLO	**ATTENZIONE** H361d - H410 - EUH401

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (kg/ha)	DOSE (g/hL)	NOTE
Broccoli	Alternariosi, Muffa Grigia	1	100	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 3 trattamenti l'anno.
Cavolfiore	Alternariosi	1	100	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 3 trattamenti l'anno.
Asparago	Stemfiliosi, Ruggine	1 - 1,5	100 - 150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 10 - 15 giorni. Max 3 trattamenti l'anno.
Carota	Alternariosi, Oidio	1	100	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 giorni. Max 2 trattamenti l'anno.
Cipolla, Aglio, Scalogno (foglie)	Botrite, Ruggine, Marciumi bianco e verde	1,5	150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 giorni. Max 2 trattamenti l'anno.
Colture Ornamentali e Floreali (in serra)	Botrite, Oidio	1 - 1,5	100 - 150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 3 trattamenti l'anno.
Colture Ornamentali e Floreali (in pieno campo)	Botrite, Oidio	1 - 1,5	100 - 150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 10 giorni. Max 2 trattamenti l'anno.
Pesco, Nettarina, Albicocco, Ciliegio	Moniliosi, Oidio	0,60 - 0,75	60 - 75	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 14 giorni. Max 3 trattamenti l'anno.
Susino	Moniliosi, Oidio Cladosporiosi	0,60 - 0,75	60 - 75	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 14 giorni. Max 3 trattamenti l'anno.
Nocciolo	Necrosi grigia	1	100	Intervallo minimo tra i trattamenti: 10 - 15 giorni. Max 2 trattamenti l'anno.
Fragola	Botrite, Oidio, Antracnosi	1,5 - 1,8	150 - 180	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 2 trattamenti l'anno.
Frutti di piante arbustive	Botrite	1,5	150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 2 trattamenti l'anno.
Altra piccola frutta a bacche	Botrite	1,5	150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 2 trattamenti l'anno.
Pomodoro	Botrite, Oidio, Cladosporiosi	1 - 1,5	100 - 150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 3 trattamenti l'anno.
Melanzana	Botrite, Oidio	1,5	150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 3 trattamenti l'anno.
Peperone	Botrite, Oidio	1 - 1,5	100 - 150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 3 trattamenti l'anno.
Scarole (in pieno campo)	Botrite, Sclerotinia	1,5	150	Max 1 trattamento l'anno.
Lattughe, Insalate	Botrite, Sclerotinia	1,5	150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 2 trattamenti l'anno.

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (kg/ha)	DOSE (g/hL)	NOTE
Valerianella (raccolta dopo lo stadio fenologico di ottava foglia)	Botrite, Sclerotinia	1,5	150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 2 trattamenti l'anno.
Spinacio	Muffa grigia	1,5	150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 2 trattamenti l'anno.
Bietola da foglia e da costa	Muffa grigia	1,5	150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 2 trattamenti l'anno.
Erbe Aromatiche	Botrite, Sclerotinia	1,5	150	Intervallo minimo tra i trattamenti: 7 - 10 giorni. Max 2 trattamenti l'anno.

- **Ampio spettro d'azione**
- **Assorbimento translaminare sui tessuti vegetali e conseguente resistenza al dilavamento**
- **Perfettamente compatibile con altri formulati impiegabili sulle colture**