# DICONET™

## Erbicida selettivo per frumento ed orzo efficace contro infestanti dicotiledoni

**SUSPO-EMULSIONABILE**

**Composizione di DICONET**
Florasulam puro g 0,58 (= 6,25 g/l)
2,4 D puro g 42,32 (= 300 g/l)
Coformulanti q b. a g. 100,0
Contiene: Fatty alcohol ethoxylate
1,2-Benzisothiazolin-3-one

**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H302**: Nocivo se ingerito. **H317**: Può provocare una reazione allergica cutanea. **H410**: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401**: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P280**: Indossare guanti/indumenti protettivi. **P301+P312**: IN CASO DI INGESTIONE: In presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. **P302+P352**: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P501**: Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

**Corteva Agriscience Italia s.r.l. – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona**
Tel. +39 0372 709900
Distribuito da:
UPL ITALIA – Via Terni, 275, 47522 S. CARLO DI CESENA (FC) –
Tel 0547.661523

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Corteva Agriscience France S.A.S Drusenheim (FR)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) - Italia
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) – SI - Italia
SINTECO LOGISTICS S.p.A.– S.Giuliano Milanese (MI) - Italia
(*solo ri-etichettatura*)
Arco Logistica S.r.l - Ferrara (FE) – Italia *(solo ri-etichettatura)*

Taglie autorizzate: **0,75 - 1 – 3 - 5 – 10 litri**
Registrazione n. 14291 del 26/06/2008 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:**
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: florasulam 6,25 g ae/l e 2,4-D 300 g ae/l, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi: **florasulam**: in caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **2,4-D**: sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione:gli spasmi muscolari in genere precedeno di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica: ospedalizzare.
**Consultare un Centro Antiveleni.**

**USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO**
Erbicida selettivo per frumento ed orzo efficace contro infestanti dicotiledoni

**CAMPI D'IMPIEGO**
**Infestanti sensibili:** *Galium aparine* (Attaccamani), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Anthemis arvensis* (camomilla bastarda), *Stellaria media* (Centocchi), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore comune), *Diplotaxis erucoides* (ruchetta violacea), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Bifora radians* (Coriandolo puzzolente), *Vicia sativa* (Veccia dolce), *Thlaspi arvense* (Erba storna comune), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio comune), *Scandix pecten-veneris* (Acicula comune).

**DOSI D'IMPIEGO**
0,75 l/ha per 200-400 litri d'acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo.

**EPOCA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE**
Il momento ottimale di applicazione avviene quando la coltura si trova nelle fasi fenologiche comprese tra accestimento e secondo nodo con le infestanti quali papavero, crocifere, ecc. ad uno stadio compreso tra le 6-10 foglie e quando *Galium aparine* non ha superato lo stadio di 15 cm di altezza. Si consiglia di effettuare il trattamento con temperature superiori agli 8-10 °C.

**AVVERTENZA**
Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc. è possibile seminare Frumento ed Orzo, Avena, Segale e Mais senza attendere nessun intervallo.

**LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE**
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:

**1)** Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacqure per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.

**2)** Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.

**3)** Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.

**4)** Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

**COMPATIBILITÀ**
DICONET è miscibile con i principali prodotti autorizzati per la protezione delle colture indicate in questa etichetta.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, floreali in genere, ecc. Pertanto è consigliabile evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

**Intervallo di sicurezza: Non richiesto**

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**ATTENZIONE:**
**DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO** (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).

**Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.**

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039 0372 709900/709999 (O.U.)

*Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 e modificata ai sensi dell'art.7 comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 01/10/2024*

™ ® Marchi registrati di Corteva Agriscience e delle società affiliate