PATTON FLEX

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

FUNGICIDA SISTEMICO PER FRUMENTO E ORZO (CODICE FRAC 3)

PATTON FLEX **ATTENZIONE**

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono

Protioconazolo	g 25 (250 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

Contiene: N,N-Dimethyl decanamide

UFI: 5WNE-D4W3-TSKD-N6FE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P410 Proteggere dai raggi solari. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.

Claudius Prinsenlaan 144 A, 4818 CP, Breda, NOORD-BRABANT, Paesi Bassi, Tel. +31 (0) 850712300

Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – Via Terni 275, 47522 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523

Officine di produzione: Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl - Ougrée (Belgio)

Officina di confezionamento: STI Solfotecnica Italiana SRL – Via E. Torricelli 2, 48033 Cotignola (RA); **GI.MA SRL** – Via Nino Bixio 6, 44042 Cento (Ferrara).

Stabilimento di rietichettatura: ARCO Logistica S.r.l. – Via Battistella 22, 44123 Ferrara (FE); **C.D.M. S.r.l. Soluzioni Logistiche** – Via Caduti di Nassirya 1/A, 31010 Cimadolmo (Treviso).

Registrazione del Ministero della Salute n. 18044 del 01/06/2023

Contenuto netto: 1-5-10 litri **Partita n° ……..**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto utilizzare tuta standard, guanti e maschera; durante l'applicazione utilizzare tuta standard e guanti.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Protioconazolo: Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Frumento (duro/tenero), Orzo: intervenire alla dose di 0,8 litri per ettaro contro Fusariosi (*Fusarium* spp.), Ruggini (*Puccinia* spp.), Septoria (*Septoria* spp.), Oidio (*Erysiphe graminis*), Elmintosporiosi (*Pyrenophora* spp.) posizionando uno-due trattamenti da inizio levata alla fioritura. Contro le fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) intervenire con un trattamento da fine spigatura a fioritura.

Utilizzare il prodotto per un massimo di 2 trattamenti annui ad un intervallo minimo di 14 giorni.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza:

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti a fine fioritura per frumento e a inizio fioritura per orzo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con i mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 1 giugno 2023

Segue etichetta con autorizzazione in deroga su riso contro brusone dal 08/06/2026 al 05/10/2026

PATTON FLEX

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

FUNGICIDA SISTEMICO PER FRUMENTO E ORZO (CODICE FRAC 3)

PATTON FLEX **ATTENZIONE**

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono

Protioconazolo	g 25 (250 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

Contiene: N,N-Dimethyl decanamide

UFI: 5WNE-D4W3-TSKD-N6FE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

*P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. *P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. *P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. *P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. *P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. *P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. *P312 In caso di malessere, contattare un CENTROANTIVELENI o un medico. *P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P410 Proteggere dai raggi solari. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.

Claudius Prinsenlaan 144 A, 4818 CP, Breda, NOORD-BRABANT, Paesi Bassi, Tel. +31 (0) 850712300

Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – Via Terni 275, 47522 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523

Officine di produzione: Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl - Ougrée (Belgio)

Officina di confezionamento: STI Solfotecnica Italiana SRL – Via E. Torricelli 2, 48033 Cotignola (RA); **GI.MA SRL** – Via Nino Bixio 6, 44042 Cento (Ferrara).

Stabilimento di rietichettatura: ARCO Logistica S.r.l. – Via Battistella 22, 44123 Ferrara (FE); **C.D.M. S.r.l. Soluzioni Logistiche** – Via Caduti di Nassirya 1/A, 31010 Cimadolmo (Treviso).

Registrazione del Ministero della Salute n. 18044 del 01/06/2023

Contenuto netto: 1-5-10 litri **Partita n° ……..**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto utilizzare tuta standard, guanti e maschera; durante l'applicazione utilizzare tuta standard e guanti.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Protioconazolo: Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Frumento (duro/tenero), Orzo: intervenire alla dose di 0,8 litri per ettaro contro Fusariosi (*Fusarium* spp.), Ruggini (*Puccinia* spp.), Septoria (*Septoria* spp.), Oidio (*Erysiphe graminis*), Elmintosporiosi (*Pyrenophora* spp.) posizionando uno-due trattamenti da inizio levata alla fioritura. Contro le fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) intervenire con un trattamento da fine spigatura a fioritura.

Utilizzare il prodotto per un massimo di 2 trattamenti annui ad un intervallo minimo di 14 giorni.

***Riso**: intervenire entro l'inizio della fioritura alla dose di 0,6 - 0,8 litri per ettaro contro Brusone (*Pyricularia Oryzae, Magnaporthe oryzae*) in funzione delle informazioni fornite dai servizi di assistenza tecnica regionali e locali, del ciclo epidemiologico del patogeno e delle strategie di difesa adottate.

Effettuare 1 trattamento all'anno.

Al fine di prevenire il rischio di insorgenza di fenomeni di resistenza è possibile l'applicazione in miscela con Thiopron® (Reg. N° 13).

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza:

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti a fine fioritura per frumento e a inizio fioritura per orzo.

***Sospendere i trattamenti prima della fioritura per riso.**

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con i mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 8.06.2026

(*) L'impiego su riso è autorizzato dal 8.06.2026 al 5.10.2026