CYTHRIN® MAX

CYTHRIN® MAX è un insetticida in emulsione concentrata a base di cipermetrina. Controlla un largo numero di parassiti delle colture arboree ed erbacee. È un insetticida non sistemico che agisce per contatto ed ingestione.

COMPOSIZIONE	Cipermetrina pura g 47,46 (500 g/L)
FORMULAZIONE	Emulsione concentrata
INTERVALLO DI SICUREZZA	28 gg per frumento, orzo, segale, triticale, avena, farro; fino a completa fioritura per mais; 21 gg per colza, senape, cotone e vite; 14 gg per barbabietola da zucchero e da foraggio, bietola rossa, rutabaga, rapa e tabacco; 7 gg per erba medica; 3 gg per tutte le altre colture ad esclusione di pioppo, olivo (piante non in produzione), ornamentali e forestali per i quali non è previsto un intervallo di sicurezza.
N° DI REGISTRAZIONE	14232 del 05.10.2011
CONFEZIONE	L 0,5
INDICAZIONI DI PERICOLO	**PERICOLO** H226 - H304 - H315 - H318 H302+H332 - H335 - H336 H373 - H410 - EUH401

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/ha)
Frumento, Orzo, Segale, Triticale, Avena, Farro	Afidi vettori della BYDV, Afidi, Nottua delle Messi (*Agrotis segetum*), Tortricide (*Cnephasia spp.*), Lema (*Oulema spp.*) Criocera (*Crioceris spp.*)	50
Mais da foraggio e da granella	Piralide (*Ostrinia nubilalis*), Sesamia (*Sesamia cretica*), Nottua gialla (*Heliothis armigera*), Nottua delle messi (*Agrotis segetum*), Diabrotica (*Diabrotica spp.*)	150
Colza (invernale e primaverile)**, Senape**	Altica (*Psylliodes chrysocephala, Phyllotreta atra*), Punteruolo (*Ceuthorrhynchus napi*), Cecidomia delle silique (*Dasyneura brassicae*), Meligete del colza (*Meligethes aeneus*), Cetonella pelosa (*Tropinata hirta*)	50
Cotone	Nottuidi terricoli (*Heliothis armigera, Pectinophora gossypiella, Earias insulana, Agrotis segetum, Spodoptera littoralis*), Afidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Tripide del tabacco (*Thrips tabaci*)	100
Broccoli, Cavolfiori, Cavoli a testa	Altica (*Phyllotreta spp.*) e Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Afidi (*Myzus spp. e Aphis spp.*), Diabrotica (*Diabrotica spp.*), Cicaline (*Empoasca spp.*), Tripidi, Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella, Pieris spp., Plutella spp., Mamestra spp., Autographa spp., Agrotis segetum*, etc.)	100
Piselli e Fagioli freschi	Tripidi, Sitona (*Sitona lineatus*), Afidi, Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella, Pieris spp., Plutella spp., Mamestra spp., Autographa spp., Agrotis segetum*, etc.)	100
Asparago	Criocera dell'asparago (*Crioceris asparagi*)	100
Carciofo	Afidi, Nottue del carciofo (*Gortyna xanthenes - G. flavago*)	100
Cipolla, Scalogno, Aglio **Melone, Zucche, Cocomeri ed altre Cucurbitacee a buccia non edibile** **Pomodoro e Melanzana**	Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella, Pieris spp., Plutella spp., Mamestra spp., Autographa spp., Agrotis segetum,* etc.), Tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Afidi (*Myzus spp e Aphis spp.*), Diabrotica (*Diabrotica spp.*), Cicaline (*Empoasca spp.*), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*)	100
Barbabietola da zucchero e da Foraggio, Bietola rossa, Rutabaga e Rapa	Cleono (*Conorrhynchus mendicus*) e Lisso (*Lixus junci*), Afidi (*Myzus spp e Aphis spp*), Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Cassida (*Cassida vittata*), Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Trichoplusia sp, Euxoa ochrogaster, E. scadens, E. tessellata, Agrotis segetum, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella*)	100

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/ha)
Carote, Sedano Rapa, Ravanelli, Scorzonera, Rafano, Pastinaca, Radici di Prezzemolo	Nottuidi terricoli e fogliari, (*Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella, Pieris spp., Plutella spp., Mamestra spp., Autographa spp., Agrotis segetum,* etc.), Altica (*Phyllotreta spp.*) e Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Afidi (*Myzus spp.* and *Aphis spp.*), Cicaline (*Empoasca spp.*), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*)	100
Patata	Afidi (*Myzus spp. and Aphis spp.*), Tignola della patata (*Phthorimaea operculella*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*)	80 - 100
Vite da vino e da tavola	Tignole della vite (*Lobesia botrana, Eupoecillia ambiguella*), Tortricidi (*Sparganothis pilleriana*), Sigaraio della vite (*Byctiscus betulae*), Cicalina (*Scaphoides titanus*), Cicalina verde (*Empoasca vitis*)	60
Olivo (piante non in produzione)	Tignola dell'olivo (*Prays oleae*) (generazione antofaga e carpofaga), Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*), Tignola verde (*Palpita unionalis*)	8-10 mL/hL Dose massima:100
Erba Medica	Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Crisomelide nero (*Colaspidema atrum*), Punteruolo (*Phytonomus variabilis*), Afidi (*Myzus spp and Aphis spp.*), Tripidi, Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Pratyedra gossypiella, Earias insulana, Agrotis segetum, Spodoptera littoralis*)	100
Tabacco	Cassida (*Cassida vittata*), Afidi (*Myzus spp and Aphis spp*), Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Tripidi, Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Trichoplusia spp, Euxoa ochrogaster, E. scadens, E.tessellata, Agrotis segetum, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella*)	100
Floreali, Ornamentali	Afidi, Tortrice mediterranea (*Cacoecimorpha pronubana*) e Bega del Garofano (*Epichoristodes acerbella*), Tripidi, Mosca Bianca, Minatori delle foglie, Nottuidi terricoli e fogliari	10-20 mL/hL Dose massima:100
Pioppo in vivaio e giovani impianti	Afidi, Saperda (*Saperda carcharias*) e Criptorrinco (*Cryptorhynchus lapathi*)	10 mL/hL Dose massima:100
Forestali in vivaio	Limantria (*Lymantria dispar*)	4 mL/hL Dose massima:100

- **Potente e immediata azione abbattente**
- **Contiene un'alta concentrazione di principio attivo**
- **La bassissima dose per ettaro lo rende particolarmente adatto al trattamento di grandi superfici**
- **Attivo contro larve, neanidi ed adulti**