SYLLIT® MAX

SYLLIT® MAX a base di dodina è un fungicida ad attività preventiva formulato in sospensione concentrata caratterizzato da elevata adesività, uniformità di distribuzione sulla vegetazione e resistenza al dilavamento. Il formulato **SYLLIT® MAX** è autorizzato anche per l'impiego su agrumi.

COMPOSIZIONE	Dodina 52,9% (544 g/L)
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata
INTERVALLO DI SICUREZZA	75gg per pesco, nettarino e mandorlo, 60gg per pomacee, 21gg per agrumi, 14 gg per ciliegio, 7 gg per olivo.
N° DI REGISTRAZIONE	18400 del 26.01.2024
CONFEZIONE	L 5
INDICAZIONI DI PERICOLO	**PERICOLO** H302+H332 - H315 - H318 H410 - EUH208- EUH401

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/ha)	DOSE (mL/hL)	NOTE
Agrumi	Alternaria e Antracnosi	1,25	-	Effettuare al max 2 trattamenti distanziati di almeno 14 giorni.
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo)	Ticchiolatura	1,25	85 - 625	Effettuare al max 2 trattamenti distanziati di almeno 7 giorni.
Ciliegio	Cilindrosporiosi , Apiognomonia	1,25	85 - 250	Effettuare al max 2 trattamenti distanziati di almeno 7 giorni.
Pesco, Nettarine	Bolla	1,65	110 - 330	Effettuare al max 2 trattamenti distanziati di almeno 7 giorni.
Mandorlo	Bolla	1,25	125 - 625	Effettuare al max 2 trattamenti distanziati di almeno 7 giorni.
Olivo	Lebbra, Occhio di pavone	1,25 - 1,65	125 - 165	Effettuare al max 2 trattamenti distanziati di almeno 7 giorni.

- **Azione indipendente dalla temperatura**
- **Resistenza al dilavamento**
- **Meccanismo d'azione specifico**