CALSUN

COMPOSIZIONE Ossido di calcio (CaO) totale 33%
Ossido di magnesio (MgO) totale 0,2%

PESO SPECIFICO 1,50 (kg/L)

FORMULAZIONE Liquido solubile

CONFEZIONE L 10

Impiegabile in agricoltura biologica

Applicazione fogliare

COLTURE	DOSE (L/ha)	MODALITÀ APPLICATIVE
Actinidia	2 - 5	Da caduta petali
Agrumi, Olivo, Frutta a guscio	2 - 20	Da post-allegagione
Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Pesco ecc.)	2 - 5	Da ingrossamento frutto fino a 4 settimane prima della raccolta
Melone, Anguria	2 - 20	Da sviluppo frutto fino ad un mese prima della raccolta
Orticole, Industriali, Floricole ed Ornamentali	2 - 20	Durante tutto il ciclo colturale in funzione del fabbisogno di calcio
Pomacee	2 - 4	Da caduta petali sino a un mese prima della raccolta
Pomodoro	2 - 20	Dallo stadio di 4-6 foglie fino ad un mese prima della raccolta
Vite	2 - 10	Da allegagione
Colture in serra	1 - 3	Da caduta petali sino a un mese prima della raccolta

Può lasciare del residuo bianco su frutti e foglie. Applicare il prodotto lontano dalla fase di fioritura.
Volume d'acqua minimo per l'applicazione del prodotto: 200 L/ha

- **Contrasta l'insorgenza di fisiopatie dei frutti (cracking, butteratura, marciume apicale, disseccamento del rachide, filloptosi)**
- **Fortifica la parete cellulare dei frutti migliorando la resistenza ai danni meccanici**
- **Protegge la coltura dai danni causati da eccessiva esposizione ai raggi UV e stress termici**