PANTERA TOP

PANTERA TOP è un erbicida di post-emergenza, selettivo e sistemico per il controllo delle infestanti graminacee annuali e perenni su numerose colture. Il prodotto viene applicato sulle infestanti in attiva crescita.

COMPOSIZIONE	Quizalofop-P-etile puro 5,26% (50 g/L)
FORMULAZIONE	Emulsione concentrata
INTERVALLO DI SICUREZZA	100 gg per colza; 60 gg per barbabietola da zucchero, barbabietola rossa e da foraggio, soia, girasole; 45 gg per lino e cotone; 42 gg per fagiolo e pisello, fagiolino, fava e favino; 40 gg per tabacco; 30 gg per fagiolo, patata, lenticchia, cece, aglio cipolla, scalogno, carota, rapa, ravanello, cavoli a testa, cavoli a infiorescenza, pomodoro, melanzana, pomacee, pesco, nettarino, nespolo, nespolo del Giappone.
N° DI REGISTRAZIONE	18445 del 01.09.2023
CONFEZIONE	L 1 - 5
INDICAZIONI DI PERICOLO	**PERICOLO**

COLTURE	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)
Cavoli a infiorescenza (Cavoli broccoli, Cavolfiore), **Cavoli a testa** (Cavolo Capuccio, Cavoletti di Bruxelles, Cavolo Verza) **altri Cavoli**	A partire dalla 2° foglia distesa	1 - 3
Pomodoro, Melanzana	A partire dalla 2° foglia distesa	1 - 3
Colza (invernale e primaverile)	Prima della chiusura della fila	1 - 3
Tabacco	Fino al termine dell'allungamento degli internodi	1 - 3
Patata	Prima della chiusura della fila	1 - 3
Erba medica, Trifoglio, Veccia	Prima della chiusura della fila	1 - 3
Pomacee (Melo, pero, Cotogno)	Prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica	1 - 3
Drupacee (Pesco, Nettarino)	Prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica	1 - 3
Nespolo, Nespolo del Giappone	Prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica	1 - 3
Agrumi	Trattare in Assenza di frutti	1 - 3
Frutta a guscio	Prima della chiusura della fila	1 - 3
Ornamentali, Vivai, Forestali	Utilizzare solo con attrezzature schermate	1 - 3
Lino, Cotone	Fino al raggiungimento della dimensione finale delle capsule	1 - 3
Soia, Girasole	Fino a fine fioritura	1 - 2,5
Barbabietola da zucchero, Bietola rossa, Barbabietola da foraggio	A partire dalla 2° foglia vera	1 - 2,5

COLTURE	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)
Aglio, Cipolla, Scalogno	Fino al 30% della dimensione finale del bulbo	1 - 1,25
Carota, Ravanello, Rapa	Dalla 1° foglia vera a prima della raccolta	1 - 1,25
Fagiolini, Fagioli, Piselli	Dalla 2° foglie vere fino al termine dell'allungamento degli internodi	1 - 1,25
Fava, Favino		1 - 1,25
Ceci Lenticchia (secchi e semi secchi) **Fagiolo** (secchi e semi secchi) **Piselli** (secchi e semi secchi)	Dalla 2° foglie vere fino al termine dell'allungamento degli internodi	1 - 1,25

INFESTANTI CONTROLLATE

- Graminacee annuali, incluse: coda di topo (*Alopecurus spp.*), loietto (*Lolium spp.*), giavone (*Echinochloa spp.*), pabbio (*Setaria spp.*), sanguinella (*Digitaria spp.*), avena (*Avena spp.*), scagliola (*Phalaris spp.*), fienarola (*Poa annua*).

- **Graminacee perennanti, incluse:** agropiro comune (*Agropyron repens*), gramigna comune (*Cynodon dactylon*), sorghetta (*Sorghum halepensis*).

- **Elevata efficacia su graminacee annuali e perenni**
- **Rapido assorbimento fogliare e traslocazione al sito d'azione**