PREVITER

PREVITER è un fungicida sistemico per la difesa di numerose colture da malattie causate da Oomiceti quali *Pythium, Phytophthora, Pseudo-peronospora, Bremia.* Il principio attivo è assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare ed è caratterizzato da elevata persistenza d'azione e selettività colturale.

COMPOSIZIONE	Propamocarb cloridrato 66,7% (722 g/L)
FORMULAZIONE	Liquido solubile
INTERVALLO DI SICUREZZA	3 gg per peperone, pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero; 14 gg per lattuga; 21 gg per Cicoria Witloof.
N° DI REGISTRAZIONE	9705 del 28.07.1998
CONFEZIONE	L 1
INDICAZIONI DI PERICOLO	**ATTENZIONE** H317 - EUH401

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/ha)	NOTE
Trattamenti fogliari:			
Cetriolo (in serra)	Oomiceti quali *Pythium, Phytophthora, Pseudoperonospora, Bremia*	1,5 - 1,7	Massimo 3 trattamenti (ogni 10 giorni minimo) a stagione.
Zucchino (in campo e serra), **Melone, Cocomero** (in campo)		1,5 - 3	
Lattuga (in campo)		1,5	
Trattamenti al terreno:			
Peperone, Cetriolo, Zucchino (in serra), **Tabacco, Floreali**	Oomiceti quali *Pythium, Phytophthora, Pseudoperonospora, Bremia*	5-10 mL/m^2	Effettuare 1 - 2 trattamenti distanziati di 7 - 10 giorni prima o immediatamente dopo il trapianto Su floreali il trattamento può essere effettuato anche successivamente.
Garofano e Gerbera		10 mL/m^2	Due giorni prima dell'impianto e procedendo successivamente all'incorporamento.
Distribuzione mediante irrigazione a goccia: **Solanacee** (Pomodoro, Peperone, Melanzana) **Cucurbitacee** (Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero) **in serra**	Oomiceti quali *Pythium, Phytophthora, Pseudoperonospora, Bremia*	2	Massimo 4 trattamenti a stagione (a distanza di 7 - 15 giorni).
Preparazione dei terricciati e dei substrati: **Vivai e Semenzai** (in serra) **di: Ortaggi a Frutto (Pomodoro, Melanzana, Zucca, Cetriolo, Melone, Zucchino, Cocomero), Cavoli** (Cavolo Broccolo, Cavolo Cappuccio, Cavolo di Bruxelles, Cavolo Cinese), **Ortaggi a Foglia** (Lattuga, Erbe fresche), **Ortaggi a Stelo** (Porro e Sedano), **Ortaggi a Tubero** (Patata e Sedano rapa), **Cipolla, Tabacco Ornamentali e Floreali.**	Oomiceti quali *Pythium, Phytophthora, Pseudoperonospora, Bremia*	300 mL/m^3	

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (mL/hL)	NOTE
Concia dei bulbi delle Floreali e delle Ornamentali **Cicoria Witloof**	*Pythium ultimum e Phytophthora*	12,5 - 300	Immergere i bulbi per 20 - 30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto per 100 litri d'acqua. Successivamente, prima della messa a dimora, trattare il terreno con 10 ml di prodotto per metro quadrato in 3 - 6 litri di acqua e successivo incorporamento a circa 10 - 12 cm di profondità. Trattamento alle radici di cicoria: distribuire 3 litri di una soluzione allo 0,3% (30 ml di prodotto in 10 litri d'acqua) per metro quadro. Applicazione in fertirrigazione: ml 12,5 di prodotto per 100 litri di soluzione.

- **Attività sistemica acropeta**
- **Ampio spettro d'azione**