

# GENIAL SL

## Fitormone - Stimolante vegetativo

### LIQUIDO



**ATTENZIONE**

Riferimento partita n.:

#### Composizione:

Acido gibberellico puro..... g 2 (= 21 g/l)  
(isomero GA<sub>3</sub>)  
Coformulanti q.b. a 100

#### Indicazioni di pericolo:

H319 – Provoca grave irritazione oculare. H335 – Può irritare le vie respiratorie. H315 – Provoca irritazione cutanea.

#### Consigli di Prudenza:

P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P261 – Evitare di respirare gli aerosol. P304 + P340 – In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P332 + P313 – In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

#### Informazioni supplementari sui pericoli:

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Nufarm Italia Srl-Viale Luigi Majno, 17/A (MI);  
sede amm.va Via Guelfa, 5 - Bologna  
Tel. 051 0394022.



Officina di Produzione :  
Torre srl - Torrenieri (SI)  
Nufarm S.A.S – Gaillon, France  
Sipcam Inagra S.A. – Valencia (Spagna)  
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Diachem S.p.A. - Via Tonale, 15 – 24061 Albano S.Alessandro (BG). Tel. +39 0363 355611

Registrazione n. 10020 Ministero della Salute del 20/04/99

Contenuto netto : ml 50 - 100 - 200 - 250 - 300 – 500;  
litri 1 - 5

#### INFORMAZIONI MEDICHE :

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Consultare un centro Antiveneni**

#### MODALITÀ D'IMPIEGO

**Genial SL** è un fitoregolatore con azione di stimolo sullo sviluppo vegetativo con azioni complementari quali l'anticipo della fioritura, della maturazione, maggior allegagione ed aumento della allegagione, pezzature uniformi, miglior colore della frutta.

Viene impiegato su (le dosi sono riferite a 100 litri di acqua, salvo diversa indicazione):

- **Agrumi** :  
ml 50 - 100 su arancio, limone e pompelmo trattando all'inizio dell'invasatura; su clementino prima della fioritura a ml 70 - 120.  
Il trattamento è effettuato per migliorare la qualità della buccia e per ridurre la cascola.
- **Fragola** : per l'anticipo della fioritura ed una precoce raccolta con due trattamenti ad un mese e mezzo dalla prevista fioritura, alla dose di ml 100 - 140.
- **Pero** : con i fiori aperti al 20 - 30 % per una migliore allegagione alla dose di ml 50 - 90; nel caso di gelate, trattare entro 48 ore per limitare il danno.

- **Carciofo** : quando si forma il primo abbozzo florale e non oltre la sesta foglia, ml 50 - 100 per anticipare la produzione dei capolini.
- **Vite** : trattamento pre-fiorale per una migliore allegagione ed uno post-fiorale contro l'acinellatura alla dose di ml 150 - 250.
- **Patata** : immergere i tuberi prima di metterli a dimora per qualche minuto ; per interrompere la dormienza in una soluzione di 5 cc/hl per tuberi tagliati e 20 cc/hl per tuberi interi.
- **Colture floricole** : ml 40 - 70, per aumentare la fioritura e con formazione di fiori più grossi.  
Alla dose minima si può intervenire ogni 20 - 30 giorni iniziando alla comparsa dei primi boccioli.

### COMPATIBILITÀ

Miscibile con i fertilizzanti fogliari.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

### FITOTOSSICITÀ

Il prodotto è fitotossico per le pere Decana del Comizio. Per le varietà di pero, fragola non citate in etichetta fare prove preliminari.

### Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura ; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.