POLTIGLIA DISPERSS®

POLTIGLIA DISPERSS® è un formulato a base di rame, preparato con un particolare procedimento industriale brevettato che garantisce la presenza del solfato di rame solamente nella sua forma di cristallizzazione più efficiente (BROCHANTITE), mentre i sali di calcio derivanti dalla reazione sono esclusivamente sotto forma di gesso. Il contenuto in rame metallo attivo e la speciale formulazione conferiscono a **POLTIGLIA DISPERSS®** un'azione fungicida e batteriostatica anche con ridotti apporti di rame per ettaro.

COMPOSIZIONE	Rame metallo puro 20% (da idrossisolfato)
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili
INTERVALLO DI SICUREZZA	3 gg per pomodoro da mensa, melanzana, peperone, zucchino, cetriolo, cetriolino, carciofo, legumi, ortaggi a bulbo e fragola; 7 gg per vite, pomacee, patata ed ortaggi a tubero, melone, cocomero, zucca, lattughe e insalate; 10 gg per pomodoro da industria; 14 gg per agrumi, castagno, olivo, nocciolo, noce, cavoli, ortaggi a radice e barbabietola da zucchero; 15 gg per actinidia; 21gg per drupacee.
N° DI REGISTRAZIONE	12096 del 21.04.2004
CONFEZIONE	kg 15
INDICAZIONI DI PERICOLO	**PERICOLO** H318 - H332 - H410 EUH401

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (kg/ha)	DOSE (g/hL)	NOTE
Vite da vino e da tavola	Peronospora, Antracnosi, Batteriosi	2,0 - 6,0	200 - 600	Modulare l'intervallo di trattamento in funzione delle condizioni climatiche e della pressione della malattia. Intervallo minimo: 5 giorni.
Pomacee*	Ticchiolatura, Batteriosi, Cancri rameali, Maculatura bruna	1,0 - 5,0	50 - 330	Da mazzetti divaricati a raccolta. Intervallo minimo: 5 giorni.
		2,5 - 7,5	170 - 500	Dall'inizio della caduta delle foglie alla comparsa dei mazzetti fiorali. Intervallo minimo: 5 giorni.
Drupacee	Bolla del pesco, Monilia (effetto collaterale), Corineo, Batteriosi, Cancri rameali	2,5 - 5,0	170 - 330	Trattamenti da inizio a fine caduta foglie. Intervallo minimo: 14 giorni.
		4,0 - 6,0	270 - 470	Trattamenti autunno - vernini. Intervallo minimo: 14 giorni
		1,0 - 1,5	100 - 150	Trattamenti in vegetazione solo su pesco, nettarino e ciliegio. Max 6 applicazioni per stagione. Intervallo minimo: 5 giorni.
Agrumi	Allupatura, Alternaria, Batteriosi	4,0 - 5,0	200 - 250	Intervallo minimo: 5 giorni.
Actinidia	Batteriosi	5,0 - 7,4	500 - 740	Da caduta foglie alla ripresa vegetativa. Intervallo minimo: 7 giorni.
		1,0 - 2,5	100 - 250	Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo minimo 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Olivo	Occhio di pavone, Lebbra, Batteriosi	2,5 - 6,0	170 - 400	Intervallo minimo: 14 giorni.
Nocciolo, Castagno	Alternaria, Antracnosi, Citospora, Batteriosi	3,0 - 6,0	200 - 400	Intervallo minimo: 14 giorni.
Noce	Batteriosi	2,5 - 7,5	250 - 1000	Da ripresa vegetativa a inizio fioritura. Intervallo minimo: 14 giorni.
Pomodoro da mensa (serra e pieno campo)	Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Batteriosi	2,5 - 5,0	250 - 500	Intervallo minimo: 5 giorni.
Pomodoro da industria (serra e pieno campo)	Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Batteriosi	2,5 - 5,0	250 - 500	Intervallo minimo: 5 giorni.
Melanzana (serra e pieno campo)	Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Batteriosi	2,5 - 5,0	250 - 500	Intervallo minimo: 5 giorni.
Patata ed ortaggi a tubero (pieno campo)	Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Batteriosi	3,4 - 6,0	340 - 600	Intervallo minimo: 7 giorni.

@ - Maggiori dettagli a pag.7

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (kg/ha)	DOSE (g/hL)	NOTE
Peperone (serra e pieno campo)	Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Batteriosi	3,4 - 6,0	340 - 600	Intervallo minimo: 7 giorni.
Cucurbitacee a buccia edibile (serra e pieno campo) **Zucchino, Cetriolo, Cetriolino**	*Psudoperonospora cubensis*, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Batteriosi	2,5 - 5,0	250 - 500	Intervallo minimo: 5 giorni.
Cucurbitacee a buccia non edibile (serra e pieno campo) **Melone, Cocomero, Zucca**	*Psudoperonospora cubensis*, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Batteriosi	2,5 - 5,0	250 - 500	Intervallo minimo: 5 giorni.
Carciofo (pieno campo)	Peronospora, Ascochitosi, Batteriosi, Alternaria, Stemfiliosi dell'asparago	2,5 - 4,0	250 - 400	Intervallo minimo: 5 giorni.
Asparago (pieno campo)				Trattare dopo la raccolta dei turioni. Intervallo minimo: 5 giorni
Cavoli (pieno campo) **Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavoletti di Bruxelles**	Peronospora, Batteriosi	2,5 - 5,0	250 - 500	Intervallo minimo: 5 giorni.
Lattughe e insalate (serra e pieno campo) **Lattughe, Scarole/ Indivie a foglie larghe, Crescione, Rucola, Dolcetta/ Valerianella, colture "baby leaf"** (comprese le brassicacee)	Peronospora, Alternaria, Batteriosi	3,4 - 5,0	340 - 500	Intervallo minimo: 5 giorni.
Ortaggi a radice (pieno campo) **Carota, Ravanello, Sedano rapa, Bietole, Rape**	Alternaria, Cercospora, Peronospora, Batteriosi	2,5 - 5,0	250 - 500	Intervallo minimo: 5 giorni.
Legumi (pieno campo) **Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia**	Antracnosi, Peronospora, Batteriosi, Ruggine	2,5 - 5,0	250 - 500	Intervallo minimo: 5 giorni.
Ortaggi a bulbo (pieno campo) **Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipollina**	Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Batteriosi, Stemfiliosi	3,4 - 5,0	340 - 500	Intervallo minimo: 5 giorni.
Fragola (pieno campo)	Antracnosi, Batteriosi, Vaiolatura rossa	3,75 - 5,0	380 - 500	Intervallo minimo: 5 giorni.
Barbabietola da zucchero	Cercospora	5,0 - 6,0	500 - 600	Max 4,8 kg/ha di sostanza attiva per anno. Intervallo minimo: 5 giorni.
Floreali e Ornamentali (serra e pieno campo)	Peronospora, Antracnosi, Batteriosi	3,4 - 5,0	340 - 500	Intervallo minimo: 7 giorni.

* fare attenzione alle varietà sensibili al rame

FORMULAZIONE DISPERSS®



Granulo **DISPERSS®**

Particelle di brochantite

Particelle rivestite di antischiuma, surfattante, adesivante.

Rapidità di dispersione

Elevata sospensività

Assenza di schiuma

Assenza di residuo umido

Assenza di polverosità

DISPERSS®

- **pH intorno alla neutralità**
- **Elevata selettività**
- **Elevata efficacia a bassi dosaggi**
- **Formulazione Disperss®**
- **Rapida e immediata dispersione**
- **Perfetta sospensione a garanzia di un'omogena distribuzione**
- **Numerosi campi d'impiego autorizzati**
- **Utilizzabile in agricoltura biologica**