CLIOPHAR 600 SL

CLIOPHAR 600 SL è un erbicida selettivo a base di clopiralid, un principio attivo appartenente alla famiglia chimica delle Piridine. Possiede un meccanismo d'azione di tipo auxinosimile (classificazione HRAC: O - auxine sintetiche). È rapidamente assorbito per via fogliare nelle piante in crescita attiva ed è prontamente traslocato per via sistemica ascendente e discendente nei tessuti in accrescimento.

COMPOSIZIONE	Clopiralid puro 60,24% (600 g/L) (da sale dimetilamminico)
FORMULAZIONE	Concentrato solubile
INTERVALLO DI SICUREZZA	Non previsto.
N° DI REGISTRAZIONE	15870 del 15.11.2018
CONFEZIONE	L 0,2
INDICAZIONI DI PERICOLO	**ATTENZIONE** H410 - EUH401

COLTURE	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSE (mL/ha)	NOTE
Avena, Frumento duro e tenero, Orzo, Segale e Triticale	Post-emergenza tra la fase di accestimento e la fase di botticella del cereale	130 - 170	
Barbabietola da zucchero e da foraggio	Post-emergenza, nei primi stadi di sviluppo delle infestanti, quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 foglie vere e il 30% di copertura del suolo. In caso di necessità è possibile intervenire su stoppione anche in avanzato stadio di sviluppo (fino a emissione dei bottoni fiorali)	130 - 170	In presenza di Camomilla o Stoppione aumentare il dosaggio a 200 - 250 mL/ha.
Colza	Post-emergenza, nei primi stadi di sviluppo delle infestanti, quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese	200 - 250	
Mais da granella e da foraggio	Post-emergenza, nei primi stadi di sviluppo delle infestanti, quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra la 3° e la 6° foglia distesa	130 - 170	
Cavolfiore, Cavoli (Cavoletti di Bruxelles, Cavoli cappucci, Cavolo cappuccio appuntito, Cavoli rossi, Cavoli verza, Cavoli bianchi) **e Rapa** (in pieno campo)	Post-emergenza, nei primi stadi di sviluppo delle infestanti, quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese	200 - 250	
Aglio, Cipolla e Scalogno (in pieno campo)	Post-emergenza, nei primi stadi di sviluppo delle infestanti, quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra la prima foglia chiaramente visibile (>3 cm) e le 4 foglie vere distese	130 - 170	Primi stadi di sviluppo delle colture (1 - 2 foglie vere).
		200 - 250	Dalle 2 alle 4 foglie vere.

PRINCIPALI INFESTANTI SENSIBILI

Annuali: Aspraggine volgare *(Picris echioides),* Camomilla *(Matricaria spp.)*, Camomilla bastarda (*Anthemis spp.*), Crisantemo campestre (*Chrysanthemum segetum)*, Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Galinsoga (*Galinsoga spp.*), Girasole (rinascite) *(Helianthus annuus),* Grespino *(Sonchus spp.),* Grespignolo o Lassana *(Lampsane communis),* Nappola *(Xantium italicum),* Saeppola canadese *(Conyza canadensis),* Stramonio *(Datura stramonium),* Veccia *(Vicia sativa).*

Biennali e perenni: Aspraggine comune o Lattaiola *(Picris hieracioides),* Cicerchia tuberosa *(Lathyrus tuberosus),* Grespino dei campi *(Sonchus arvensis),* Erba medica (ricacci) *(Medicago sativa),* Stoppione *(Cirsium arvense),* Trifoglio *(Trifolium spp.).*

PRINCIPALI INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

Annuali: Convolvolo nero *(Polygonum convolvulus),* Cicuta aglina o Prezzemolo bastardo *(Aethusa cynapium),* Lappolina *(Torilis arvensis),* Visnaga maggiore *(Ammi majus).*

Biennali e perenni: Farfara *(Tussilago farfara).*

PRINCIPALI INFESTANTI MEDIAMENTE RESISTENTI

Annuali: Attaccamani *(Galium spp.),* Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Erba morella *(Solanum nigrum),* Poligoni *(Polygonum spp.).*

Biennali e perenni: Amaranto *(Amaranthus spp.),* Ortica maggiore *(Urtica dioica),* Rovi *(Rubus spp.),* Stellaria *(Stellaria media),* Crucifere *(Brassicaceae),* Labiate *(Labiatae).*

- **Partner dei prodotti di post emergenza**
- **Prodotto specifico per il controllo di Composite (es. Stoppione) ed Ombrellifere (es. Carota selvatica)**
- **Prodotto ad elevata concentrazione adatto per il trattamento di grandi superfici**
- **Attivo anche contro alcune infestanti ruderali di difficile controllo (esempio: Cardo mariano)**