

PANAREX

Erbicida selettivo contro le infestanti graminacee

Concentrato emulsionabile (EC)

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo A (HRAC)

PANAREX

UFI: RFXD-A449-GSK6-ASHQ

PERICOLO

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Quizalofop-P-Tefuryl g 4,38 (= 40 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

Contiene: olio minerale paraffinico, alcol etossilato.



INDICAZIONI DI PERICOLO

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

H411 Tossico per l'ambiente acquatico con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P 273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo i regolamenti nazionali.

Titolare dell'autorizzazione:

Arysta Lifescience Great Britain Ltd., 3-5 Melville Street, EH3 7PE Slough, Edinburgh, UK

Distribuito da:

UPL ITALIA S.r.l. – Via Terni 275, 47522 S. Carlo di Cesena (FC) – Tel. 0547 661523

Stabilimento di produzione: Arysta Lifescience Ougrée Production sprl – 26/2 Rue de Renory – B4102 Ougrée (Belgio); Arysta Lifescience S.A.S., BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères (Francia);

Stabilimento di rietchettatura: ARCO Logistica S.r.l. – via A. Battistella 22, 44123 Ferrara

Registrazione del Ministero della Salute n. 17986 del 03.02.2022

Contenuto netto: 1 l – 5 – 10 – 20

Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento protettivo dopo l'uso. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza di 5 m da corpi idrici superficiali e da aree non coltivate. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza di 5 m dal margine dell'area coltivata verso l'interno.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Effetti irritanti, polmonite. I sintomi possono essere ritardati. La procedura di primo soccorso deve essere stabilita in consultazione con il medico.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleli.

CARATTERISTICHE: PANAREX è un erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza delle colture sotto riportate contro le infestanti graminacee. Il prodotto viene applicato sulle infestanti già emerse e viene rapidamente traslocato a tutte le parti della pianta. L'effetto erbicida si manifesta nell'arco di 7-14 giorni, sulla base dell'andamento stagionale.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Epoca d'impiego
Colza e Ravizzone	Dai cotiledoni alla fine della fioritura
Barbabietola da zucchero	Dalle due foglie vere fino alla fase di accrescimento del fittone
Barbabietola da foraggio	Dalle due foglie vere fino alla fase di accrescimento del fittone
Patata	Dalle due foglie vere fino al pieno sviluppo delle bacche
Cotone	Dalle due foglie vere fino all'apertura delle capsule
Girasole	Dalle due foglie fino all'inizio della maturazione dei semi
Soia	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli
Culture da seme (Prezzemolo, Erba cipollina, Senape, Coriandolo, Papavero, Zucca, Rapa, Ravanello, ecc...)	Dai cotiledoni alla fine della fioritura
Fagiolo da granella	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli
Pisello da granella	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli
Cicerchia e cicerchiella da granella	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli
Lenticchia	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli
Cece	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli
Lupino da granella	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli
Fava da granella	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli
Favino da granella	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli
Cipolla, Aglio, Scalogno	Dalle due foglie fino alla pre-raccolta

Contro infestanti annuali: utilizzare 0,5 – 2,2 litri/ha di prodotto in 50-400 litri di acqua. Effettuare un trattamento all'anno.

Contro infestanti perenni: utilizzare 1,75 – 2,2 litri/ha di prodotto in 50-400 litri di acqua. Effettuare un trattamento all'anno.

INFESTANTI SENSIBILI

- **Annuali:** Coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), Avena selvatica (*Avena fatua*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*, *Echinochloa colonum*), Loglio (*Lolium multiflorum*, *Lolium rigidum*), Falso panico (*Panicum dichotomiflorum*), Panico (*Panicum miliaceum*), Scagliola minore (*Phalaris minor*), Pabbio (*Setaria spp*).

- **Perenni:** Falsa gramigna (*Agropyron repens*), Capellini (*Agrostis stolonifera*), Avena bulbosa (*Arrhenatherum bulbosum*), Gramigna comune (*Cynodon dactylon*), Sorghetta (*Sorghum halapense*).

INTERVALLO DI PRE-RACCOLTA

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per cipolla, aglio e scalogno. 60 giorni prima della raccolta delle altre colture.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Allo scopo di prevenire o ritardare la comparsa di infestanti resistenti, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo di azione e adottare le più opportune buone pratiche agricole, quali ad esempio la rotazione culturale. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti e informare le autorità competenti in caso di sospetta resistenza.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.