CONTOR®

CONTOR® è un erbicida solfonilureico selettivo di post-emergenza per mais, pomodoro e patata in grado di controllare efficacemente numerose graminacee annuali e perenni e diverse infestanti a foglia larga. Assorbito sia a livello fogliare che radicale, viene rapidamente traslocato fino ai giovani tessuti in via di accrescimento delle infestanti, bloccandone la crescita. L'azione si manifesta visivamente attraverso ingiallimento, necrosi e successivo disseccamento delle infestanti. **CONTOR®** non ha attività residuale ed è pertanto efficacie solo sulle infestanti emerse al momento del trattamento.

COMPOSIZIONE	Rimsulfuron puro 25%
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili
INTERVALLO DI SICUREZZA	Non previsto.
N° DI REGISTRAZIONE	16837 del 11.01.2017
CONFEZIONE	0,1 Kg
INDICAZIONI DI PERICOLO	**ATTENZIONE** H319 – H410 - EUH401

COLTURE	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)	NOTE
Mais	Post-Emergenza	50	Entro la quarta-quinta foglia di sviluppo, prevalentemente in caso di elevata infestazione di graminacee. In caso di maggiore pressione di infestanti a foglia larga, si consiglia di frazionare gli interventi al fine di garantire il controllo anche sulle nuove malerbe emerse dopo la prima applicazione. In tal caso si consiglia un primo intervento a 30 g/ha in post emergenza precoce e una nuova applicazione a 20 g/ha entro 8-15 giorni dalla prima e comunque entro la quarta-quinta foglia vera della coltura.
Pomodoro	Post-Emergenza	60	Al superamento della crisi di trapianto effettuare una singola applicazione nel periodo compreso fra la terza e l'ottava foglia vera della coltura, in particolare in caso di prevalente infestazione di *Solanum nigrum*. In caso di infestanti ad emergenza scalare e di graminacee perenni è possibile effettuare due applicazioni frazionate del prodotto, la prima alla dose di 60 g/ha nella fase iniziale della coltivazione e la seconda alla dose di 50 g/ha fra 8 e 15 giorni dopo, comunque entro e non oltre l'ottava foglia di sviluppo della coltura.
Patata	Post-Emergenza	60	Intervenire nella fase di accrescimento dei getti laterali, corrispondente ad un'altezza della coltura compresa fra i 10 ed i 20 cm. Effettuare una singola applicazione a dose piena di 60 g/ha. In caso di infestanti ad emergenza scalare effettuare una prima applicazione a 60 g/ha nella prima fase di sviluppo dei germogli laterali, intorno ai 10 cm di altezza della coltura, e una seconda applicazione a 30 g/ha fra 8 e 15 giorni dopo.

INFESTANTI SENSIBILI:

Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Stellaria media* (Centrocchio comune), *Elytrigia repens* (Gramigna comune), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *Anagallis arvensis* (Centocchio dei campi), *Portulaca oleracea* (porcellana comune), *Digitaria ischaemum* (Sanguinella emostatica), *Orobanche sp.* (orobanche), *Cyperus sp.* (Zigolo)

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:

Matricaria chamomilla (Camomilla), *Solanum nigrum* (Erba morella).

- **Prodotto altamente selettivo**
- **Controllo contemporaneo di numerose infestanti sia graminacee che dicotiledoni**
- **Fondamentale nelle strategie di controllo di Solanum nigrum**