ZEVOMO

Fungicida in sospensione concentrata per vite, patata, colture orticole e tabacco

Mandipropamid - Codice FRAC 40

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono
Mandipropamid puro g 23,3 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente secondo le normative vigenti.

UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.

Claudius Prinsenlaan 144 A, 4818 CP, Breda, NOORD-BRABANT, The Netherlands Tel. +31 (0) 850712300

Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – Via Terni 275, 47522 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523

Officine di produzione: UPL Europe Ltd. - Cheshire (UK); Cerexagri S.A. - Bassens (Francia); Cerexagri S.A. - Marsiglia, Le Canet (Emcia C E); Cerexagri S.A. - Mourenx (Francia); Superform Chemistries Ltd. - Ankleshwar (India); UPL Ltd. - Ankleshwar (India); Superform Chemistries Ltd. - Vapi (India); Superform Chemistries Ltd. - Jhagadia (India); Arysta LifeScience Ougrée Production sprl - Ougrée (Belgio); Arysta LifeScience SAS - Nogueres (Francia); Arysta LifeScience India Limited - Kalol (India); Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd - Hebei (Cina); **Officina di confezionamento:** GI.MA SRL - Cento (FE); S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA). **Stabilimento di rietichettatura:** Arco Logistica Srl – Ferrara (FE); CDM Srl – Cimadolmo (TV).

Registrazione del Ministero della Salute n. 19304 del 20/04/2026

Contenuto netto: mL 250-300-500-600; L 1-1,2-1,5-1,8-2-2,4-5-10-20 **Partita n° ……**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Durante la miscelazione e il caricamento del prodotto usare guanti adatti. Rientrare in campo quando la vegetazione è completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 1 metro dai corpi idrici superficiali per patata, lattughe e insalate, erbe fresche, cucurbitacee e pomodoro;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per vite

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di malessere, consultare un medico per i consueti interventi di primo soccorso. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

ZEVOMO è attivo contro gli oomiceti fitopatogeni (e.g. *Plasmopara viticola)*. Il prodotto è in larga parte trattenuto dai primi strati cerosi della vegetazione trattata, assicurando, dopo l'asciugatura del deposito, una notevole resistenza al dilavamento. Una parte del prodotto è in grado di penetrare nelle foglie inibendo l'accrescimento del micelio durante il periodo d'incubazione esplicando quindi un'attività citotropica e translaminare.

ZEVOMO è raccomandato per applicazioni preventive. Iniziare I trattamenti quando si verificano condizioni predisponenti la malattia. Utilizzare le dosi più alte e gli intervalli più brevi in caso di condizioni meteorologiche favorevoli (precipitazioni frequenti o particolarmente intense) ad un rapido sviluppo dei patogeni.

Coltura	Parassiti	Dose (mL/hL)	Dose (L/ha)	Note
VITE	Peronospora *Plasmopara viticola*	50-60	0.5-0.6	Massimo 4 trattamenti / anno (intervallo tra i trattamenti: 10-12 giorni)
POMODORO (pieno campo e serra)	Fitoftora *Phytophthora infestans*	60	0.6	Massimo 4 trattamenti / anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni)
MELONE (pieno campo e serra)	Pseudoperonospora *Pseudoperonospora cubensis*	60	0.6	Massimo 4 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni)
ZUCCHINO (pieno campo e serra)	Pseudoperonospora *Pseudoperonospora cubensis*	60	0.6	Massimo 4 trattamenti / anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni)
PATATA (pieno campo)	Fitoftora *Phytophthora infestans*	60	0.6	Massimo 6 trattamenti / anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni)
LATTUGHE E INSALATE (pieno campo e serra)	Bremia *Bremia lactucae* Peronospora *Peronospora parasitica*	60	0.6	In campo: massimo 2 trattamenti / anno con intervallo di 7 giorni tra un trattamento e il successivo. In serra: massimo 1 trattamento / anno
ERBE FRESCHE (pieno campo e serra)	Peronospora *Peronospora spp. Plasmopara crustosa*	-	0.6	In campo: massimo 2 trattamenti / anno con intervallo di 7 giorni tra un trattamento e il successivo. In serra: massimo 1 trattamento / anno
TABACCO (pieno campo)	Peronospora *Peronospora tabacina*	75	0.6	Massimo 3 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 14 giorni)

N.B.: adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:
- Vite e orticole: volume di riferimento per le dosi ad ettaro:1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare riferimento alle dosi indicate per ettaro.
- Tabacco: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 800 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare riferimento alle dosi indicate per ettaro

Preparazione della miscela

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Riempire la botte o il serbatoio d'acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

Note ed istruzioni per l'uso

Strategia antiresistenza: Peronospora della vite *(Plasmopara viticola)*: Effettuare non più di 4 trattamenti all'anno con prodotti appartenenti al gruppo CAA.

Compatibilità: in caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, specie per le colture orticole, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste. Vite: non applicare il prodotto nei vivai.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per vite e patata, 7 giorni per lattughe ed insalate, erbe fresche, 3 giorni per pomodoro, melone e zucchino.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 4 settembre 2026