OVIPRON® TOP

OVIPRON® TOP è un olio estivo che impiega una base paraffinica a bassa viscosità. Il formulato presenta quindi un'elevata selettività sulla pianta ed una fluidità che facilita l'operatore nelle fasi di dosaggio e di distribuzione.

COMPOSIZIONE	Olio minerale paraffinico 96,5% (800 g/L) (N. CAS 97862-82-3)
FORMULAZIONE	Liquido emulsionabile
INTERVALLO DI SICUREZZA	20 gg.
N° DI REGISTRAZIONE	11416 del 23.07.2002
CONFEZIONE	L 5 - 25 - 1000
INDICAZIONI DI PERICOLO	**PERICOLO** H304 - H411 - EUH401

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/hL)	DOSE (L/ha)	NOTE
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat, Arancio amaro)	Cocciniglie, Eriofidi, Afidi, Acari, Mosca bianca	1 - 3,5	20 - 35	Massimo 4 applicazioni.
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno)	Cocciniglia grigia e altre Cocciniglie, Eriofidi, Acari, Psilla del pero, Afidi, Afide lanigero	1 - 3,5 da caduta foglie a mazzetti divaricati	20 - 35 da caduta foglie a mazzetti divaricati	Massimo 4 applicazioni.
		1 - 2 in vegetazione alla presenza dell'infestazione	10 - 20 in vegetazione alla presenza dell'infestazione	
Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino, Mandorlo)	Cocciniglia grigia, Cocciniglia bianca e altre Cocciniglie, Eriofidi, Afidi, Acari	1 - 3,5 da caduta foglie a bottoni rosa	20 - 35 da caduta foglie a bottoni rosa	Massimo 4 applicazioni.
		1 - 2 in vegetazione alla presenza dell'infestazione	10-20 in vegetazione alla presenza dell'infestazione	
Noce, Nocciolo, Castagno	Cocciniglie, Eriofidi, Afidi, Acari	1 - 3,5 fino ad ingrossamento gemma	20 - 35 fino ad ingrossamento gemma	Massimo 4 applicazioni.
		1 - 2 in vegetazione alla presenza dell'infestazione	10-20 in vegetazione alla presenza dell'infestazione	
Vite (da tavola e da vino)	Cocciniglie, Eriofidi, Afidi, Acari	1 - 3,5 da caduta foglie a gemma cotonosa	25 - 35 da caduta foglie a gemma cotonosa	Massimo 4 applicazioni.
		1 - 2 in vegetazione alla presenza dell'infestazione	10 - 20 in vegetazione alla presenza dell'infestazione	
Kiwi	Cocciniglia bianca	1 - 3,5 da caduta foglie a gemma cotonosa	20 - 35 da caduta foglie a gemma cotonosa	Massimo 4 applicazioni.
		1 - 2 in vegetazione alla presenza dell'infestazione	10 - 20 in vegetazione alla presenza dell'infestazione	
Olivo (olive da olio e da tavola)	Cocciniglie	1 - 3,5	20 - 30	Massimo 4 applicazioni.
Kaki, Fico	Cocciniglie, Eriofidi, Afidi, Acari	1 - 3,5 da caduta foglie a ripresa vegetativa	20 - 35 da caduta foglie a ripresa vegetativa	Massimo 4 applicazioni.
		1 - 2 in vegetazione alla presenza dell'infestazione	10 - 20 in vegetazione alla presenza dell'infestazione	

@ - Maggiori dettagli a pag.7

- **Ampia etichetta, impiegabile a tutto ciclo**
- **Adatto per colture arboree ed ornamentali**
- **Utilizzabile in agricoltura biologica**