PANTOX® 360 SUPER

PANTOX® 360 SUPER è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato prevalentemente verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con apparato fogliare ben sviluppato.

COMPOSIZIONE	Glifosate acido puro 31,2% (360 g/L) (da sale isopropilamminico)
FORMULAZIONE	Concentrato solubile
INTERVALLO DI SICUREZZA	7 gg per olivo da olio. Non previsto per le altre colture.
N° DI REGISTRAZIONE	16833 del 07.10.2016
CONFEZIONE	L 1 - 5 - 20
INDICAZIONI DI PERICOLO	H411 - EUH401

COLTURE	INFESTANTI CONTROLLATE	DOSE (L/ha)	Note
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purchè ben lignificato: **Agrumi, Pomacee** (Melo, Pero)**, Noce, Nocciolo, Vite e Olivo** (eccetto Le Olive raccolte da terra) **Olive da olio:** nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 L/ha almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta). **Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato: Drupacee** (albicocco, Ciliegio, Nettarine, Pesco E Susine), **Mandorlo, Actinidia. Piante Floricole E Ornamentali, Forestali, Vivai Di Pioppo.** **Colture sulle quali occorre assolutamente evitare ogni contatto e il diserbo richiede esclusivamente l'uso di attrezzature selettive** (barre lambenti, umettanti o a goccia): **Orticole** (Carciofo, Pomodoro, Melanzana, Fagiolino, Fava, Pisello), **Rosa.** **Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di Fragola, Ortaggi, Barbabietola Da Zucchero, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Mais, Riso, Soia, Lino, Senape, Colza, Girasole, Cotone, Prati, Vivai** prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione o di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento. Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili (esclusi parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie), sedi ferroviarie. Su argini di canali e fossi il prodotto deve essere impiegato a non meno di 30 giorni dall'immissione dell'acqua.	*Alopecurus spp.* (coda di topo), *Avena spp.* (avena selvatica), *Hordeum murinum* (orzo selvatico), *Lolium spp.* (loietto), *Mercurialis spp.* (mercorella), *Poa spp.* (fienarola), *riso crodo, Ammi majus* (sedano selvatico), *Amaranthus spp.* amaranto), *Calendula spp.* (calendula), *Chenopodium spp.* (farinaccio), *Orobanche spp.* (succiamele), *Portulaca spp.* (porcellana), *Raphanus spp.* (ravanello selvatico), *Senecio spp.* (senecio), *Sinapis spp.* (senape), *Stellaria spp.* (centocchio), *Veronica spp.* (veronica)	1,5 - 4	In tutte le applicazioni non superare la dose complessiva di 4,320 Kg/ha di sostanza attiva nell'arco dell'anno, corrispondente a 12 L/ha di prodotto per anno.
	Agropyron repens (agropiro), *Carex spp.* (carice), *Cirsium spp.* (stoppione), *Euphorbia spp.* (euforbia), *Glyceria spp.* (gliceria), *Hypericum spp.* (erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (serla), *Phalaris spp.* (scagliola), *Rumex spp.* (romice), *Sonchus spp.* (grespino), *Sorghum halepense* (sorgo selvatico)	4 - 5	
	Alisma spp. (mestolaccio), *Asfodelus spp.* (asfodelo), *Butomus spp.* (fiorone), *Cyperus spp* (zigolo), *Ferula spp.* (ferula), *Juncus spp.* (giunco), *Nardus spp.* (cervino), *Scirpus spp.* (scirpo), *Sparganium spp.* (sparganio), *Tussilago spp.* (farfaraccio)	5 - 6,33	
	Arbusti: *Acer spp.* (acero), *Fraxinus spp.* (frassino), *Genista spp.* (ginestra), *Salix spp.* (salice), *Sambucus spp.* (sambuco), *Vaccinum spp.* (mirtillo)	4 - 6	

- **Ideale per la preparazione dei letti di semina/trapianto**
- **Indispensabile per le tecniche colturali di minima lavorazione o non lavorazione**
- **La mancanza di residualità facilità le operazioni colturali successive all'applicazione (semine, trapianti, ecc.)**